


ชื่อพื้นเมือง

ไม้ต้นไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 24 เมตร เปลือก สีเทา เรียบหรือแตก เปลือกในสีเหลือง ใบ กว้าง 4-8 ซม. ยาว 8-20 ซม. ออกเวียนรอบกิ่ง รูปขอบขนานถึงรี หรือรูปไข่กลับแคบ ปลายเรียวแหลม โคนทู่หรือกลม มักเบี้ยวเล็กน้อย แผ่นใบไม่มักเป็นพู่หรือเป็นซี่ฟัน (ยกเว้นในต้นกล้า) เนื้อคล้ายหนัง ด้านบนเกลี้ยงสีเขียวเข้ม เกลี้ยงหรือมีขนกระจายบนเส้นกลางใบทั้งสองด้าน เส้นใบ 6-10 คู่ เส้นใบย่อยเป็นร่างแหหรือชั้นบันไดเบี้ยวๆ จางด้านบนหรือค่อนข้างแบนด้านล่าง ก้านใบยาว 1-3 ซม. เรียวเล็ก ส่วนมากมีขนยาวแข็ง ไม่เป็นเกล็ด หูใบยาว 2-6 ซม. มีขนยาวแข็ง ร่วงเร็วทิ้งรอยแผลใบเป็นวงรอบกิ่ง กิ่งเรียวเล็ก เกลี้ยง หรือมีขนกระจายเมื่ออ่อน ช่อดอกกลม ออกเดี่ยวบนกิ่งที่มีใบตามลำต้นหลักและกิ่งใหญ่ๆ (ช่อดอกตัวผู้บางที่ออกตามซอกใบ) ช่อดอกตัวผู้กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 2-5 ซม. รูปขอบขนานหรือทรงกระบอก สีเขียวอ่อนถึงออกเหลือง ช่อดอกเพศทรงกระบอกถึงถึงรูปไข่ กลับกันช่อยาว 2-7 ซม. มีหนาม ผล กว้าง 10 -15 ซม. ยาว 20-35 ซม. สักรูปไข่ถึงทรงกระบอกไม่สม่ำเสมอ มีตุ่มทู่ตรงพรีมิต ยาว 1.5-3 มม. เปลือกบางแก่จัดสีน้ำตาลอมเหลือง ถึงน้ำตาลทอง เมล็ดขนาดประมาณ 3 ซม. มีเนื้อบางและอัม แต่ลอกออกง่ายปลูกทั่วไปในภาคใต้และคาบสมุทรมลายูไม่พบที่อื่นในไทย ผลสุกมีกลิ่นคล้ายทุเรียนกล่าวกันว่า ไม้ป่าสูงได้ถึง 40 เมตร ใบเกลี้ยง และผลมีขนาดเล็กกว่า ไม้มีกลิ่น พบในคาบสมุทรมลายูและกล่าวกันว่าพบในภาคใต้ด้วย



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=3309>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

