

จันทน์ชะมด

Aglaia silvestris (M.Roem.) Merr.

วงศ์ MELIACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น ขนาดกลางถึงใหญ่ สูงได้ถึง 30 ม. เมื่ออ่อนมีลำต้นเดี่ยว เรือนยอดกลมกว้าง เมื่อแก่มีพุ่มรูปตัวแอล(L) เปลือก สีครีมถึงสีน้ำตาลอมเทา แตกตื้น มียางใสหรือขาว ใบ ยาว 20-65 ซม. ใบประกอบแบบขนนกยดเดี่ยว ใบย่อย 6-9 คู่ ออกสลับ กว้าง 2-6 ซม. ยาว 8-22 ซม. รูปขอบขนานถึงรูปใบหอกแกมรี ปลายเรียวแหลม โคนห้หรือกลม เบี้ยว ใบอ่อนมีเกล็ดแน่นทั้งสองด้าน ใบแก่คล้ายหนังบาง ด้านบนเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียวแกมทองแดง มีเกล็ดรูปโล่สีน้ำตาลกระจายถึงแน่น เมื่อแก่เกลี้ยง เส้นใบ 12-21 คู่ ใบข้างมีก้านใบยาวได้ถึง 0.5-1 ซม. ใบปลายยาวได้ถึง 2 ซม. กิ่งเล็กเรียว มีเกล็ดรูปโล่สีน้ำตาลแน่น ดอก ยาวได้ถึง 3.5 มม. สีเหลืองอ่อน รูปไข่กลับ กลิ่นหอม ช่อดอกยาวได้ถึง 30 ซม. ก้านดอกยาวได้ถึง 2 มม. มีเกล็ดแน่น กลีบเลี้ยงยาว ไม่เกินครึ่งหนึ่งของกลีบดอก ปลายจักลึก 5 พู มีเกล็ด กลีบดอก 5(6) กลีบ ผลอดเกสรเพศผู้ยาวกว่ากลีบดอกรูปไข่กลับ ปากหลอดสั้นผ่านศูนย์กลางยาว 0.3 มม. ปลายไม่จัก อับเรณู 5 อัน โผล่พ้นปากหลอด ผล กว้างได้ถึง 2 ซม. ยาวได้ถึง 2 ซม. ออกเป็นช่อ กว้างได้ถึง 25 ซม. ยาวได้ถึง 30 ซม. มีได้ถึง 50 ผล รูปไตแบน สีน้ำตาลอมส้มถึงสีเหลือง หรือออกแดง มีเกล็ดแน่น แก่ไม่แตก มี 1-2(3) ส่วน แต่ละส่วนมี 1 เมล็ด มีเนื้อบางใสหุ้ม พบน้อยในป่าดิบ สูงถึง 500 ม.



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โรเบิร์ต ฟินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปท. 2559. 792 หน้า
ภาพประกอบ : <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Aglaia+silvestris>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

