

Barringtonia macrostachya (Jack) Kurz

วงศ์ LECYTHIDACEAE

จิกนุ่ม

ชื่อพื้นเมือง : นมยาน จิกนุ่ม จิก

ไม้ต้นขนาดเล็กสูงได้ถึง 20 เมตร แต่กิ่งกระจาบ เปลือก สีครีมสัน้ำตาลเรียบหรือแตกเป็นร่องละเอียด ตามแนวตั้ง เปลือกในสีครีมมีปีวสีม่วงเล็กๆ มีเส้นใยใบกว้าง 5-8 ซม. ยาว 14-32 ซม. ก้านใบยาว 3 - 10 ซม. รูปขอบขานถึงรูปไข่กลับหรือรูปใบหอกกลับปลายแหลมโคนรูปลิ่มกว้างขอใบจักละเอียดในเครื่องบนเนื้อคล้ายกระดาษหนังสีเขียวเข้มเป็นมันด้านบนเกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบ 13-20 คู่ ดอก ยาวประมาณ 6 ซม. เป็นช่อยาว 20 - 60 ซม. มี 60-80 ดอก ที่ปลายกิ่งหรือซอกใบหรือใต้แผ่นใบ แกนกลางดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 มม. ที่โคน ไม่มีก้านดอก หลอดกลีบเดี่ยวยาว 4-7 ซม. รูปรวรย เป็นเหลี่ยมเมื่อตัดขวาง มี 4 สัน เกลี้ยงปลายมี 4 พุ ก็อบเท่ากัน ยาว 5-8 มม. กลีบดอก 4 กลีบ กว้างประมาณ 1.3 ซม. ยาว ประมาณ 2.5 ซม. สีขาวออกเขียวอ่อนถึงสีชมพู หรือสีม่วงอมแดง รูปไข่ถึงรีหรือขอบขาน โคนเชื่อมกับหลอดเกสรตัวผู้ขึ้นมา 5 มม. เกสรตัวผู้ยาว 2.5 - 3.5 ซม. เรียง 4 วง สีขาวหรือมีแต้มสีชมพูโกล้าโคน ถึงสีชมพูโคนขาว รังไง 4 ช่อง ก้านเกสรตัวเมียยาว 5-7 ซม. สีชมพูหรือแดง ผล กว้าง 2-4 ซม. ยาว 5-8 ซม. รูปไข่หรือรูปไข่กลับ ปลายแบบ โคนกลม เป็นเหลี่ยมเมื่อตัดขวาง มักมี 4 สัน กว้าง 2-3 มม. สีเขียวขุ่นเมื่อสุกมักมีสีแดงหรือม่วงแต้ม พบร้าไปเป็นไม้หั้นรองในป่าติดสูงประมาณ 500 เมตร มักพบใกล้น้ำหรือในที่ชื้นตื้นแต่ จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป



ชื่อยุทธภัณฑ์ : ไนมอน การ์ดเนอร์, ชนชาติเชื้อชาติ กองกำลังนา ขยายอุดuct ไม้ป่าภาคใต้ ๒ – ชิงฟ์ศรีที่ ๑-กรุงเทพฯ โครงการจัดซื้อคืนป่าพี. ๒๕๕๙. ๗๙๒ หน้า
ภาพประกอบ : สุนทรีวิจัยและพัฒนาวัสดุธรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

