

จิกใหญ่

Barringtonia augusta Kurz

วงศ์ LECYTHIDACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้นสูงได้ถึง 15 ม. แตกกิ่งกระจาย เปลือก สีครีมถึงน้ำตาล เรียบหรือแตกเป็นร่องละเอียดตามแนวตั้ง เปลือกในสีครีม มีวงสีม่วงเล็กๆมีเส้นใย ใบ ยาว 32-65 ซม. เส้นใบ 18-30 คู่ ช่อดอกใหญ่ ยาวได้ถึง 250 ซม. แกนกลางที่โคนกว้างประมาณ 8 มม. ไม่มีก้านดอก หลอดกลีบเลี้ยงมีขน มีสันเป็นคลื่น 4 เส้น กว้าง 1-2 มม. ผลมีสันเป็นคลื่น กว้าง 2-5 มม. พบใกล้ลำน้ำในป่าดิบที่ต่ำ สูงประมาณ 100 ม. จ.ระนอง พังงา



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คสบฟ. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพผล : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพใบ : http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant&view=showpics&pt=4621



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

