

ชื่อพื้นเมือง

ไม้ต้น สูงถึง 30 เมตร ลำต้นตรง แตกกิ่งสูงชัน เรือนยอดแคบ ไม่สม่ำเสมอ มีปีกและพู่พอนที่โคนต้น เมื่ออายุมากขึ้น เปลือก สีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลอมเทาเข้ม เป็นสันและร่องชิดกันมักแตกเป็นริ้วบางๆ เปลือก ในสีน้ำตาลอมเหลืองถึงสีส้มอ่อน นุ่มและเป็นเส้นใย ไม่มีน้ำยางและน้ำเลี้ยว ใบ เดี่ยว ออกตรงข้าม แผ่นแบน รูปไข่แคบถึงรูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 4-8 ซม. ยาว 8-18 ซม. ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนทู่หรือรูปลิ้น ขอบเรียบ ใบอ่อนออก 2-3 คู่แต่ละครั้ง สีส้มม่วง เป็นเป็นสีน้ำตาลอมชมพู ใบแก่ เนื้อบาง สีเขียวเป็นมันและ เกลี้ยงด้านบน สีอ่อนกว่าและเกลี้ยงหรือมีขนละเอียดด้านล่าง เส้นกลางใบจมและเป็นร่องด้านบน เส้นใบ 6-9 คู่โค้ง จมด้านบน ไม่เชื่อมกันที่ขอบ เส้นใบย่อยค่อนข้างจางทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. มีหูใบขนาดเล็ก ร่วงเร็ว ทั้งรอยแผลเป็นอยู่ระหว่างคู่ใบ กิ่งสีน้ำตาลแดงเข้ม เป็นเหลี่ยม มีสันตื้น 4 สันเมื่ออ่อน ตามข้อค่อนข้างบวม ดอก เล็ก สีเขียวอ่อนหรือสีครีม ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ข้างต้น เป็นช่อแตกแขนง ยาวถึง 28 ซม. ที่ปลายกิ่ง ตามซอกใบหรือใต้ตาใบ ก้านดอกยาว 1-3 มม. กลีบเลี้ยงรูปถ้วยตื้น ยาว 2.5-4 มม. ปลายแยกเป็นแฉกรูปสามเหลี่ยม 4-5 แฉก ยาว 1 มม. มีขนสีน้ำตาลแดงด้านบน และขนสีขาวด้านในโดย เฉพาะดอกเพศผู้ ไม่มีกลีบดอก ดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้ 4-5 อัน ยาว 3 มม. ติดที่ขอบของ ถ้วยกลีบเลี้ยง ระหว่างแฉก ก้านเกสรเพศเมียเป็นหมันสั้น ดอกเพศเมียมีเกสรเพศผู้เป็นหมันสั้น ก้านเกสรเพศเมีย ยาว 1-2 มม. ยอดเกสรมี 2 พู รังไข่เหนือวงกลีบมี 2 ช่อง ผลกลมหรือรูปไข่กลับ ยาว 0.4 ซม. สีม่วงเข้มกลีบเลี้ยงและ ก้านเกสรเพศเมียติดแน่น ค่อนข้างแบนและเป็นร่อง ขนละเอียด แก่แตก 2(3) ส่วน ปล่อยเมล็ดเล็กปีกบาง แคบออกมา พบทั่วไปในป่าดิบที่ต่ำ ป่าดิบ-ป่าไผ่ สูงถึง 1000 ม. มักพบในป่าถูกทำลายและป่ารุ่น



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน ฟินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาฤดี ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปท. 2558. 768 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

