

ชื่อพื้นเมือง

ไม้ต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 27 ม. โคนต้นเป็นร่องและมีพุพอน เปลือก สีน้ำตาลอ่อน เเรียบถึง มีเกร็ดเป็นยื่นๆเปลือกในสีเหลืองอ่อน ใน ยาว 12-20 ซม. ในประกอบแบบขนนกยอดคู่ ใบย่อย 2-3(4) คู่ ออกกิ่งตรงข้าม กว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 7-13 ซม. ในบนไฟญี่สุด และเห็นเป็นใบปลาย รูปรีถึงไข่กลับ ปลายเรียว แหลม โคนรูปลิม เเบี้ยวเล็กน้อย เนื้อคล้ายหนังบาง เกลี้ยงและเป็นมันทั้งสองด้าน ไม่มีตุ่นใบ เเฉพาะบนเส้น กลางใบ ด้านล่างไม่มีนวล ไม่มีต่อม เส้นใบ 15-20(30) คู่ ขนาดกัน ทำมุนแคบและค่อนข้างตรงไปถึงใกล้ขอบ ใบ มีเส้นใบสั้นแซม บุนทั้งสองด้าน เส้นใบย่อยขนาดกันเส้นใบข้าง และเห็นชัดเกือบท่าๆกัน ก้านใบย่อยยาว ประมาณ 0.5 ซม. เป็นร่องตื้นด้านบนโคนป่องเล็กน้อย ก้านช่อใบยาว 2-4 ซม. กิ่งสีน้ำตาลเข้ม เกลี้ยง ยกเว้น ที่ปลาย ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อแตกแขนงแคบ ยาว 3-10(15) ซม. ตามซอกใบหรือเหนือซอกใบ เล็กน้อย มักอยู่เป็นกลุ่ม ไม่มีก้านดอกย่อย กลีบเลี้ยงยาว 1-2 มม. จักรลักษณะ 5 พู ซ้อนกันในติดดอก มีขนตามขอบ กลีบดอก 5 กลีบ ยาวถึง 2.5 มม. รูปไข่ถึงไข่กลับ แยกจากกัน แต่โคนเชื่อมติดกับหลอดเกสรเพศเมีย หลอด เกสรเพศเมียกลม ขอบเป็นคลื่นหรือซี่ฟัน อันเร侄ู 10 อัน เรียง 2 วง วงบน 5 อัน โผล่พ้นปากหลอดเล็กน้อย ติดลับกัน 5 อันล่างที่อยู่ในหลอด ไม่มีจานฐานดอกรังไข่ 5 ช่อง ก้านเกสรเพศเมียสั้น มียอดเกสรเพศเมีย กลมหรือจักเป็นพุเล็กน้อย ผล ยาวได้ถึง 5 ซม. รูปไข่กลับหรือคล้ายผลมะเดื่อปลายปุ่ม มีขันสัน สีเหลืองแน่น แกมไม้แทรก เมล็ด 1-2(5) มีเนื้อเล็กน้อย พบน้อยในปั๊ดบีที่ค่อยข้างสมบูรณ์ สูงได้ถึง 800 ม. จ. พัทลุง สงขลา



ข้อมูลอ้างอิง : ไรมอน การ์เดนเซอร์ ศิริกา ลิปธุนพร กองการคาด ขยายบุตุ ไม้ป่าภาคใต้เฉลี่ย 2 – ศิริกอร์ที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์ปีที่ 2559, 792 หน้า
ภาพประกอบ : http://www.phytoimages.siu.edu/imgs/pelserpb/r/Meliaceae_Reinwardtiodendron_humile_82600.html



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

