

ขนาน

Pterospermum littorale Craib var. *littorale*

วงศ์ MALVACEAE (Sterculiaceae)

ชื่อพื้นเมือง : กะหนาย ยวนปลา (ภาคใต้) จำปาเทศ จำปีแขก (ภาคกลาง) ทำอาว (หนองคาย)

ไม้ต้น เล็ก สูง 5-15 ม. กิ่งก้านเล็กเรียว ใบกว้าง 4-7 ซม. ยาว 8-16 ซม. รูปร่างหลายแบบ จักเป็นพูแบบนิ้วมือในต้นอ่อน รูปลิ้นหรือรูปไข่ ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนหูก่อนข้างเบี้ยวในใบแก่ ขอบเรียบหรือจักซี่ฟันเล็กห่าง โดยเฉพาะทางปลายใบ มีขนละเอียด ด้านล่างเป็นนวล เส้นใบเล็กเรียว ฐานด้านล่าง หูใบยาว 1 ซม. รูปแถบไม่จัก กว้างและยาวได้ถึง 50 ซม. ก้านใบยาวได้ถึง 40 ซม. ดอก ยาว 6 ซม. สีขาวหรือออกเหลือง าดดอกกว้าง 0.5 ซม. ยาว 1.5-2 ซม. รูปขอบขนาน โคนมีใบประดับแคบ 3 ใบ ไม่จัก กลีบเลี้ยงกว้าง 0.5-0.8 ซม. ยาว 5-6 ซม. โคนเชื่อมกันเล็กน้อย รูปใบหอกกลับ มีขนกลีบดอก 5 กลีบ แยกกว้าง 1 ซม. ยาว 5-6 ซม. มีขนเกสรตัวผู้สมบูรณ์ 15 อัน ยาว 2-2.5 ซม. เป็นหมัน 5 อัน ยาว 2.5-3 ซม. ก้านเกสรตัวเมียยาว 2.5-3 ซม. ยอดเกสรตัวเมียบิดมี 5 อัน มีขนทั่วไป ผล กว้าง 4 ซม. ยาว 7 ซม. รูปไข่ มีสันตรง 5 สัน หรือสันเป็น คลื่นเล็กน้อย มีขนเมื่ออ่อน แก่เกือบเกลี้ยง แข็ง ไม่มีใบประดับหรือกลีบเลี้ยงติดที่โคน เมล็ดกว้าง 0.5 ซม. ยาว 2 ซม. รวมปีก พบตามป่าผลัดใบ ป่ารุ่น และที่โล่งทั่วไป มักขึ้นบนหินปูนหรือใกล้ชายฝั่งทะเล



ข้อมูลอ้างอิง : ไข่มอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2559 792 หน้า.

ภาพประกอบ : http://rpplant.royalparkrajapruek.org/Display/details_fn/5091



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

