

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้น

สูง 25 ม. กิ่งก้านเล็กสีน้ำตาลเข้ม เปลือกสีน้ำตาล แตกเป็นรอยประสานกัน เรียบ หรือแตกเป็นร่องละเอียด เปลือกในสีส้ม มียางสีขาวมาก ใบ กว้าง 1-4.5 ซม. ยาว 6-16 ซม. รูปรี ปลายเรียวแหลม โคนสอบ แผ่นใบค่อนข้างบาง ขนเกลี้ยง เส้นใบ 4-7 คู่ โค้งขึ้นใกล้ขอบใบ ก้านใบ ยาว 0.4-0.7 ซม. ดอกสีขาว ที่โคนมีแต้มเขียว ออกเป็นกระจุกๆ ละ 4-25 ดอก ขนาดประมาณ 3 ซม. กลีบเลี้ยงกว้างประมาณ 1 มม. ยาวประมาณ 2 มม. สีเขียวอ่อน รูปไข่ ปลายแหลม เกี้ยง ยก เว้นที่ขอบกลีบ กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน เป็น หลอดยาว 5-9 มม. ด้านในมีขน ด้านนอกเกลี้ยง ปลายแยกออกเป็นพูกลีบ ยาว 11-13 มม. มีขน ทั้งสองด้าน เกสรเพศผู้ติดที่ส่วนบนของหลอด และ โผล่พ้นหลอด อับเรณูกว้างประมาณ 0.5 มม. ยาว ประมาณ 2.5 มม. รังไข่ขนาดประมาณ 1.5 มม. มีขน ก้านเกสรเพศเมีย ยาว 4-8 มม. เกี้ยง ผล กว้าง 8-50 ซม. ยาว 8 ซม. แบนเล็กน้อย ไม่มี ช่องอากาศ เมล็ดกว้างประมาณ 0.2 ซม. ยาว ประมาณ 7-10 ซม. (รวมจะงอย) ขนยาว 1-8 ซม. พบในป่าดิบที่ต่ำ ความสูง 300 ม.

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาฤดี ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2558. 768 หน้า: ภาพประกอบ

ภาพประกอบ : ภาพบน-ภาพกลาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพล่าง https://www.flickr.com/photos/ys_yeoh/8108707294/in/photostream/

