

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นเล็ก สูงได้ถึง 9 ม. เรือนยอดเปิดแผ่กว้าง เปลือก สีเทาอ่อนถึงสีน้ำตาลอมส้ม เรียบ หรือหยาบ มีรอยแผลใบกลมใหญ่ เปลือกในสีครีม ใบ เดี่ยว ออกเวียนสลับ รูปไข่กว้าง พบข้างรูปรี กว้าง 7-15 ซม. ยาว 13-25 ซม. ยาวน้อยกว่า 2 เท่าของความกว้าง โคนห่อหรือรูปหัวใจตื้น ขอบจักตื้นปลายเป็นต่อม ยอดอ่อนมีขนสั้นสีขาว ใบแก่บาง มีขนกำมะหยี่ด้านล่าง เส้นใบ 9-12 คู่ ไม่เชื่อมกันที่ขอบ ก้านใบยาวได้ถึง 8 ซม. เป็นร่องจางๆมีต่อมนูน 2 ต่อมนที่ปลาย หูใบเล็ก รูปสามเหลี่ยม ร่วงเร็ว กิ่งใหญ่ มีลายละเอียด สีน้ำตาลอมส้ม ดอก ขนาด 3-5 มม. สีเขียวถึงขาว แยกเพศ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ต่างต้น ออกเป็นช่อเชิงลดเล็กเรียวไม่แตกแขนง ตามซอกใบ เมื่ออ่อนมีขนแน่น ไม่มีกลีบดอก ดอกเพศผู้ ช่อดอกยาว 10-40 ซม. ดอกยาวประมาณ 5 มม. อยู่เป็นกลุ่มถึง 8 ดอก ก้านดอกยาว 2-3 มม. ใบประดับกว้างประมาณ 1 มม. ยาวประมาณ 2 มม. กลีบเลี้ยง 3(4) กลีบ รูปไข่ ยาวประมาณ 2.5 มม. เกสรเพศผู้มี 15-25 อัน แยกกัน มีต่อมที่โคนเกสร ไม่มีรังไข่เป็นหมัน ดอกเพศเมียออกเป็นช่อ ยาว 8(20) ซม. ดอกยาวประมาณ 3 มม. ก้านดอกยาว 2-4 มม. ใบประดับกว้างยาวประมาณ 1.5 มม. กลีบเลี้ยง 3-4(5) กลีบ ยาวประมาณ 2 มม. ต่อมนเล็กกว่ากลีบเลี้ยง โคนไม่เชื่อมกัน รังไข่ขนาดประมาณ 3 มม. มี 3-4 ช่อง ยอดเกสรเพศเมีย มี 3-4 อัน แยกกัน ยาวประมาณ 1 มม. ไม่แตกง่าม ผล กว้างประมาณ 0.5 ซม. ยาวประมาณ 1 ซม. สีเขียวหรือสีเขียวแกมน้ำเงินปนเทาปกคลุมด้วยขนกำมะหยี่สีขาวแน่น เป็นร่องตื้นหรือเป็นสัน แก่แตก 3-4 เสี่ยง มีแกนกลางผลติดแน่น ยาวประมาณ 4 มม. เมล็ดยาว 3-4 มม. สีดำ มีเยื่อบางหุ้มสีแดง พบกระจายทั่วไปในภาคใต้ ในป่าค่อนข้างเปิด หรือป่ารุ่ม มักพบบนเขาหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไจมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=2811>