

ชื่อพื้นเมือง

ไม้ต้นขนาดกลางหรือใหญ่ สูงได้ถึง 35 เมตร มีพุ่มพองสั้น เปลือก สีน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้ม แตกเป็นแผ่นและเป็นเกล็ด เปลือกในสีเหลืองอ่อนมีเส้นสีส้ม ใบ กว้าง 4.8-14 ซม. ยาว 15-35 ซม. ส่วนมากออกเป็นกระจุกใกล้ปลายกิ่ง รูปไข่กลับถึงขอบขนาน ปลายทู่หรือแหลม (พบน้อยที่เป็นแฉ่ง) โคนแคบ เนื้อคล้ายหนัง ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเทา(มีนวล) เมื่ออ่อนมีขนสีสนิม มีขนกระจายถึงเกลี้ยงด้านล่าง เส้นกลางใบเป็นร่อง มีสันตรงกลาง เส้นใบ 8-16 คู่ ยาวไปใกล้ขอบใบ ด้านบนเป็นวง เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันได ก้านใบยาว 1.5-4 ซม. ดอก ออกเป็นกลุ่ม มี 4-8 ดอก ออกตามกิ่งแก่ได้รอยแผลใบ ก้านดอกยาว 1.2-1.8 มม. กลีบเลี้ยง ยาว 2.5-4 มม. มีขนละเอียดสีน้ำตาลด้านนอก เกลี้ยงด้านใน กลีบดอกยาว 1.2-1.5 มม. สีเขียวอ่อนถึงสี ออกเหลือง แฉกจักลึกมากกว่า 1/2 กลีบ เป็นแฉกรูปใบหอกแกมขอบขนาน เกลี้ยงทั้งสองด้าน เกสรตัวผู้มี 12 อัน ยาวประมาณ 8 มม. อับเรณูมีขน ก้านชูอับเรณูเล็กเรียว เกลี้ยง ยาวประมาณ 5 มม. รังไข่รูปโคน เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาว 1.8-3 มม. ผล กว้างได้ถึง 2.2 ซม. ยาวได้ถึง 2.8 ซม. รูปกลมหรือขอบขนานแกมรี เกลี้ยง เมล็ดใหญ่ 1 เมล็ด พบตามป่าดิบที่ต่ำ



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : ภูมิรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพช่อดอก/ผล : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=3048>

ภาพใบ/ลำต้น : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

