

ไม้พุ่มตรงหรือเลื้อยพัน สูงได้ถึง 4 เมตร กิ่งเล็กคดไปมา ไม่มีหนาม ใบ กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 4-8 เซนติเมตร ออกสลับ รูปไข่ ปลายเรียวแหลม โคนกลมถึงรูปหัวใจตื้น ขอบจักซี่ฟันละเอียดที่ปลายมีต่อม เมื่ออ่อนมีขนสั้นไหมสีทอง ใบแก่เนื้อคล้ายหนังบาง เป็นมันด้านบน เกือบหรือเกือบทั้งสองด้าน เส้นใบหลักออกจากโคนใบ 3(5) เส้นโค้งแหลมชัน 2-3 คู่ ก้านใบ 1-1.5 เซนติเมตร ทุใบรูปสามเหลี่ยมยาว ประมาณ 1 มิลลิเมตร ดอก ขนาด ประมาณ 0.5 เซนติเมตร สีเหลืองออกเขียวอ่อนดอกสมบูรณ์เพศและดอก เพศผู้ ออกเป็นกระจุกกระจุกหนึ่งมีดอกไม่มาก ที่ง่ามใบ ก้านช่อดอกยาวน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร ก้านดอกยาว 1-2 มิลลิเมตร (ยาว 5-15 มิลลิเมตร ในผล) เล็กเรียว กลีบเลี้ยงเป็นรูปครึ่งวงกลมหรือคล้ายจานรองถ้วย ปลายเป็นแฉกสามเหลี่ยม 5 แฉก ขนาด 1-1.4 มิลลิเมตร มีขนสั้นไหมด้านนอกเมื่ออ่อน ด้านในเป็นสันกลีบ ดอก 5 กลีบ ขนาดประมาณ 1.5 มิลลิเมตร คล้ายห่มวงครอบโคนแฉก เกสรเพศผู้ มี 5 อัน ขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร ช่อนอยู่ในกลีบดอก ตรงกลางดอกมีจานฐานดอกนุ่มสีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 มิลลิเมตร แบนหรือเป็นแอ่งเล็กน้อย รังไข่จมอยู่ในจานฐานดอกครึ่งหนึ่ง มี 3 ช่อง เกือบก้านเกสร มี 3 อัน ทางออก ปลายคล้ายแถบหนัง โคนเชื่อมกันขึ้นมาครึ่งหนึ่ง ผล ขนาดประมาณ 0.8 เซนติเมตร ก้านผลล่ำ ยาวได้ถึง 1.3 เซนติเมตร กลมหรือเป็น 3 พู มีถ้วยกลีบเลี้ยงติดที่โคน สุกสีออกดำ และแตกออกเป็น 3 ส่วน เมล็ดขนาด 5 มิลลิเมตร – พบในป่าพุ่มตามชายฝั่งบนดินทราย



ข้อมูลอ้างอิง : การ์กเนอร์, โชนอน, ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากฯ จ้ากัก (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Colubrina+asiatica>

