

ขนุนป่าใบเล็ก

Artocarpus kemando Miq.

วงศ์ MORACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น

ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 25 ม. กว้าง 3-8 ซม. ยาว 7-18 ซม. ออกเวียนสลับ รูปรีขอบขนานหรือไข่กลับ ปลายเรียวแหลมสันถึงหูหรือกลม โคนรูปไข่ถึงกลม แผ่นใบเป็นพู่หรือจักซี่ฟัน เนื้อใบคล้ายหนังเกลี้ยงหรือมีขนกระจายถึงค่อนข้างแน่น โดยเฉพาะบนเส้นกลางใบทั้งสองด้าน เส้นใบ 8-15 คู่ โค้ง ไม่แตกแขนง เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันได กิ่งนูนด้านล่าง ก้านใบยาว 1-3 ซม. เล็ก ขนละเอียด ไม่เป็นเกล็ด หูใบยาว 0.7-2 ซม. ขนละเอียด ร่วงเร็ว ทั้งรอยแผลเป็นวงรอบกิ่ง ข้อดอกกลม ออกเดี่ยวหรือพบบ้างเป็นคู่ตามซอกใบ ข้อดอกเพศผู้กลมหรือรูปดอกเห็ด กว้างประมาณ 0.5 ซม. ยาว 2-4 ซม. ก้านช่อยาว 0.7-1.5(2) ซม. ทรงกระบอก มีร่อง ขนกำมะหยี่สีน้ำตาล ข้อดอกเพศเมียก้านช่อยาว 1-4 ซม. รีถึงรูปไข่ ขนกำมะหยี่สีน้ำตาล ผล กว้างได้ถึง 2.5 ซม. ยาวได้ถึง 4 ซม. ก้านผลยาว 1.2-4 ซม. ทรงรีถึงกลม มีตุ่มหู ยาวประมาณ 2 มม. เปลือกหนา เมล็ดยาวประมาณ 8 มม. พบในป่าดิบที่ต่ำและป่าพรุ



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โสมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <https://www.flickr.com/photos/reulimv/43578356662/in/photostream/>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

