

ไม้ต้น ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 40 เมตร เรือนยอดเป็นรูปขอบขนานแน่น เปลือกสีครีมถึงเทาออกน้ำตาล เรียบ หรือมีรอยแตกแคบตามแนวตั้ง เปลือกในสีส้มออกชมพูอ่อน มีขีดแนวตั้งสีขาว ใบ กว้าง 5-14 เซนติเมตร ยาว 10-30 เซนติเมตร ออกเรียงเวียน รูปรีถึงขอบขนาน หรือถึงรูปไข่ปลายแหลมถึงเรียวแหลมสั้น โคนกลมถึงกึ่งรูปหัวใจ ไม่จักเป็นพู ขอบใบไม่จักหรือจักละเอียดไปยังปลาย ส่วนยอดและก้านใบมีขนหยาบสีน้ำตาลอมส้ม แน่น ใบแก่เนื้อคล้ายหนัง ด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีเขียวอมเหลือง มีขนแข็งโดยเฉพาะบนเส้นใบทั้งสองด้าน เส้นใบ 8-12 คู่ แตกแขนงหรือแตกเป็นง่ามห่างออกมาจากขอบใบ เส้นใบย่อยคล้ายชั้นบันไดห่าง ก้านใบยาว 1-4 เซนติเมตร มีขนค่อนข้างเป็นสะเก็ด หูใบยาว 1-3 เซนติเมตร มีขนหนามสีน้ำตาล ร่วงเร็ว ทั้งรอยแผลไว้ข้อ ดอกกลม ออกเดี่ยว ที่ซอกใบ ช่อดอกเพศผู้กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ยาว 2-2.5 เซนติเมตร ทรงกลมหรือรูปไข่ ช่อดอกเพศเมียค่อนข้างกลม ผล ยาว 5-10 เซนติเมตร มีหนามแข็งยาว 5-10 มิลลิเมตร (มองเห็นๆ คล้าย ผลทุเรียนแต่หนามทุกว่าและมียางมาก) เมื่อสุก สีเขียวสด เมล็ด ขนาด 1-1.5 เซนติเมตร พบบ่อยในท้องถิ่น ตามป่าที่ต่ำที่ถูกรบกวน จังหวัดตรัง สตูล



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <https://postimg.cc>