

ชื่ออื่น : สีทัน ข้าวิล แบกไฟร อีตี้ คอแคนแอน ไม้หนาดลิง

ไม้พุ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 2-8 ม. เรื่องยอดเป็นพุ่มกลม เปลือกเรียบสีน้ำตาลคล้ำถึงน้ำตาลอ่อน ในประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ประกอบด้วยใบย่อย 1-4 ใบ เรียงตรงข้ามถึง เรียงสลับ ก้านช่อใบ แข็ง สีน้ำตาลแดง โคนก้านป่อง แผ่นใบปวยรูปไข่ถึงรูปไข่ โคนใบแหลมถึงมนกลม หรือเยื้อง ขอบใบเรียบถึง ม้วน ลงเล็กน้อย ปลายใบ แหลมหรือเรียว ผิวใบเกลี้ยง หั้งสองด้าน เนื้อใบบาง ดอก แบบช่อแยกแขนง ออก ตามกิ่ง งามใบ หรือปลายยอดเที่ยม ช่อดอกยาวถึง 25 ซม. ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น แต่ละช่อประกอบ ด้วย ดอก ย่อยจำนวนมาก สีขาวอ่อน มีสีขาวแต้ม มีกลิ่นหอม ไม่มีกลิ่นดอก ก้านดอกสั้นมาก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม โคนเชื่อมติดกันเล็กน้อย ด้านนอกมีขนประปาอย ด้านในเกลี้ยง เกสรเพศผู้ 6-9 อัน ก้านเกรสรสีขาว อับเรณูสีน้ำตาลอ่อน ยอดเกรสรเพศเมียหยักเป็นพุ ผล แบบผลแห้งแตกกลางพู รูปทรงมนกลม ผลสุกสีแดง ผิวเกลี้ยง เมล็ดรูปทรงกลม มี 1 เมล็ด สีน้ำตาลคล้ำถึงน้ำตาลเข้ม น่วงคำ ผิวเป็นมันวาว เชือหุ้มเมล็ด มีน้ำเงินเรื้อร พบทั่วไปตามขอบป่าชายเลนติดต่อกับป่าชายหาด ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเข้า ออกดอกเดือน ม.ค.-ส.ค. ออกผลระหว่างเดือนเม.ย. - ธ.ค. การกระจายพันธุ์ อินเดีย ตอนใต้ของจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดถึงออสเตรเลีย



ข้อมูลอ้างอิง : การค้นหาร่องรอย ใหม่อน น้ำป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อวิินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชิชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

