

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็ก แตกกิ่งกระเถิบสูงได้ถึง 10 เมตร มักมีหลายลำต้น เปลือก สีครีมถึงน้ำตาลออกเทา เรียบ มีช่องอากาศเล็กจำนวนมาก เปลือกในสีครีม ใบ กว้าง 2-8 เซนติเมตร ยาว 8-18 เซนติเมตร (ส่วนมากยาวมากกว่า 2.5 เท่าของความกว้าง) รูปไข่แคบถึงใบหอก ปลายเรียวแหลม โคนทู่หรือกลม ขอบเรียบหรือมีซี่ฟันเล็กห่าง ใบแก่เนื้อบาง สีเขียวเป็นมันด้านบน ด้านล่างสีอ่อนกว่า มีต่อมเป็นขีดเข้ม กลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบ 5-9 คู่ โค้ง เส้นใบย่อยห่าง ก้านใบเล็กยาว 0.6-1.7 เซนติเมตร กิ่งคด สีน้ำตาลอมเทา กลี้ยง ดอก เป็นช่อเล็ก แตกแขนงจำนวนมาก (แบบช่อแยกแขนง) ยาวได้ 4-15 เซนติเมตร ที่ง่ามใบหรือใกล้ปลายกิ่ง ก้านดอกยาว 1-2 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงหรือมีขน กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 0.8 มิลลิเมตร จักจี้ประมาณครึ่งกลีบเป็นแฉกๆ มีขนสั้นตามขอบ กลีบดอกยาว 2-3 มิลลิเมตร รูประฆัง พูกลมเป็นคลื่น ยาวเกือบเท่าหลอดกลีบ เกสรเพศเมียยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมียมี 2 พู ผล ขนาดประมาณ 0.3 เซนติเมตร กลม ปลายมีกลีบเลี้ยงเล็ก สีเขียวอ่อนถึงขาว หรือสีน้ำตาลอมครีม พบในป่าที่ถูกทำลายและป่ารุ่น สูงได้ถึง 1,200 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชยอน. ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <https://medthai.com/ข้าวสารหลวง/>