

Strobocalyx arborea (Buch.-Ham.) Sch. Bip.

กะพวมกะพรว้า

วงศ์ ASTERACEAE

ชื่อพื้นเมือง : ชี้อ้น จวง อ้ายเหนียวหมา ตอนเลาะ นวลแบ่ง สมองกุ่ม



ไม้ต้น

สูง 10-15 ม. มีขนสีน้ำตาลแดงตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ ก้านช่อดอก และวงใบประดับ ใบเรียงเวียน รูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 10-25 ซม. ปลายแหลมยาว ก้านใบยาว 1-3.5 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่นแยกแขนง ออกตามปลายกิ่ง ก้านช่อกระจุกสั้น ติดบนวงใบประดับที่เรียงซ้อนเหลื่อมกันประมาณ 5 วง ยาว 2-3 มม. แต่ละช่อมี 3-5 ดอก ไม่มีใบประดับย่อย ดอกสีชมพูอมม่วง หลอดกลีบดอกยาว 5-7 มม. ปลายแยกเป็น 5 แฉก รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 1.5 มม. เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดภายในหลอดกลีบดอก รังไข่ได้วงกลีบ มีช่องเดียว ก้านเกสรเพศเมียแยก 2 แฉก เรียวยาวม้วนงอ ผลแห้งเมล็ดล่อน รูปไข่กลับ ยาวประมาณ 2 มม. มี 8-10 สัน มีขนยาว แพนปัสเป็นขนแข็ง ติดทน เรียง 2 วง วงในยาว 5-7 มม. วงนอกสั้น พบที่อินเดีย เนปาล ศรีลังกา จีนตอนใต้ พม่า เวียดนาม คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ ของไทย ขึ้นตามป่าดิบชื้นหรือริมลำธาร ความสูงถึงประมาณ 400 เมตร

ข้อมูลอ้างอิง : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Strobocalyx0arborea0\(Buch.-Ham.\)0Sch.0Bip.](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Strobocalyx0arborea0(Buch.-Ham.)0Sch.0Bip.)

ภาพประกอบ : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Strobocalyx0arborea0\(Buch.-Ham.\)0Sch.0Bip.](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Strobocalyx0arborea0(Buch.-Ham.)0Sch.0Bip.)



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

