

กะตังใบ

ชื่ออื่น : ตะนานงใบ ซ้างเชิง ตังหวาย ตองจั่วม ตองต้อม บังบ้ายตัน

ไม้พุ่ม รอเลือย หรือไม้ต้น สูงได้ถึง 7 ม. กิ่งมีซ่องอากาศ ทูใบมีปีกรูปไข่กลับ ยาวได้ถึง 6 ซม. ในประกอน 1-3 ชั้น ในประกอนย่อยมีได้ถึง 4 คู่ แกนกลางยาว 9-70 ซม. ก้านยาว 7-34 ซม. ในย่อยรูปไข่ แกมรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาวได้ถึง 30 ซม. ขอบจักพื้น ก้านใบยาว 0.2-2 ซม. ข้อดอกส่วนมากยาวได้ถึง 27 ซม. แผ่นกว้าง ก้านซ่อนยาวได้ถึง 10 ซม. ดอกสีเขียวอ่อนหรืออมเหลือง ก้านดอกยาว 0.5-1.5 มม. กลีบเลี้ยงรูปถ้วยยาวประมาณ 2 มม. ปลายจักตื้น ๆ กลีบดอกยาว 3-4 มม. ผลกลีบประมาณกึ่งหนึ่ง หลอดเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันยาว 1.2-2.2 มม. โคนแยกกัน ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 1 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาว 1-2 มม. ผลจักเป็นพุลเล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9-1 ซม. ผลแก่สีน้ำตาลแดง พับตั้งแต่อ่อนเดียวถึงอสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยพบทุกภาค ขึ้นหลักหอยสภาพป่า ความสูงถึงประมาณ 2000 เมตร คล้ายกับ กระตังใบแดง *L. rubra* Blume และ *L. guineensis* G. Don ซึ่งทั้งสองชนิดมีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีแดง



ข้อมูลอ้างอิง : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Leea%20indica%20\(Burm.%20f.\)%20Merr](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Leea%20indica%20(Burm.%20f.)%20Merr).

ภาพประกอบ : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Leea%20indica%20\(Burm.%20f.\)%20Merr](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Leea%20indica%20(Burm.%20f.)%20Merr).

