

# กระถินณรงค์

*Acacia auriculiformis* Benth.  
วงศ์ FABACEAE

**ไม้ต้น** ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 28 ม. เรือนยอดค่อนข้างกลมบาง เปลือกสีเทาอ่อน เรียบหรือแตกเล็กน้อย



**ใบ** : ใบกว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 10-16 ซม. ดอกคล้ายใบเดี่ยว (เป็นก้านใบที่ตัดแปลงมา) โค้งชดปลายแหลมโคนแคบ ใบแก่สีเขียวออกเทา เนื้อหนาค่อนข้างเกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบหลัก 3-5 เส้น รวมกันยังไปโคนที่ซีก ใบด้านหนึ่ง ค่อนข้างจาง ไม่ออกเหลือง เส้นใบย่อยค่อนข้างขนานกับเส้นใบหลัก ก้านใบยาว ประมาณ 0.5 ซม. มีต่อมพอง ขนาดประมาณ 1 มม. กิ่งเล็กเรียว ไม่มีหนาม เพียงเป็นสันหรือมุมเล็กน้อย



**ดอก** : ดอกสีเหลืองทอง กลิ่นหอม ออกเป็นช่อคล้ายช่อเชิงลดเล็กเรียว ยาวประมาณ 10 ซม. ก้านช่อสั้น ยาว 0.5-1 ซม. มักออกเป็นคู่ตามซอกใบบนๆ ดอกไม่มีก้าน กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 1 มม. เกสรเพศผู้ ยาวประมาณ 3 มม. รังไข่มีขนละเอียด



**ผล** : ผลกว้าง 1.2 ซม. ยาวประมาณ 7 ซม. แบนขอบเป็นคลื่น บิดเวียนเป็นวง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5-4 ซม. แก่เป็นสีน้ำตาล แตกตามขอบทั้งสองด้าน เมล็ดกว้าง 3.5 มม. ยาวประมาณ 5 มม. เรียงทแยงขวางตามฝัก ทรงรี สีดำ มีเยื่อสีส้มหุ้มรอบ

นำมาปลูกจากประเทศออสเตรเลีย พบปลูกกันมาก ปัจจุบันแพร่พันธุ์ทั่วไปในภาคใต้

อ้างอิงข้อมูล : ไชมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร และก่องกานดา ชยามฤต. ไม้ป่าภาคใต้เล่ม 2. ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ ; 2559 (หน้า 841)

ภาพประกอบ : Flickr by ( Shubhada Nikharge, Stephen Buchan, PRORussell Cumming, naturgucker.de enjoynature.net, AINuN MaRdiAh)



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Parks Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)