

ชื่อไทย

Terminalia nigrovenulosa Pierre

วงศ์ COMBRETACEAE

ชื่อพื้นเมือง : กำจาย,กำจำ,ซี่อ้าย,คำเจ้า,ตานแดง,แนอาม,เบ็น,ประดู่ขาว



ไม้ต้น

ผลัดใบ สูง 5-25 ม. เปลือกแตกเป็นร่องตื้น เปลือกในสีน้ำตาลแดง ต้นอ่อนกิ่งลึกรูปคล้ายหนาม ใบรูปไข่ ยาว 6-10 ซม. ขอบใบมีต่อมหนึ่งคู่ใกล้โคน ก้านใบยาว 1-3 ซม. ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง 3-6 ช่อ ช่อย่อยแบบช่อเชิงลด ยาว 3-6 ซม. มีขนสั้นนุ่ม ช่อดอกย่อยที่สองยาว 2.5-5 ซม. แต่ละช่อมี 4-5 ดอก ใบประดับรูปเส้นด้าย ยาว 1-1.5 มม. หลอดกลีบเลี้ยงยาวประมาณ 1 มม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ยาว 1-2 มม. ด้านในมีขน ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้ 10 อัน ยาวเท่า ๆ กลีบเลี้ยง จานฐานดอกจักมนมีขนหนาแน่น ก้านเกสรเพศเมีย ยาว 2.5-3 มม. ผลมี 3 ปีก รูปขอบขนาน ยาว 1.5-3.3 ซม. มีเมล็ดเดียว รูปรี พบที่อินเดีย พม่า จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีน และคาบสมุทรมลายู ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง บนเขาหินทรายหรือหินปูน ความสูงถึงประมาณ 1000 เมตร เปลือกใช้เคี้ยวกับหมาก

ข้อมูลอ้างอิง : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsLinkno=1146>

ภาพประกอบ : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsLinkno=1146>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

