

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้น ไม้ผลัดใบ สูง 5-30 ม. เรือนยอดเปิด แตกกิ่งด้านข้าง เปลือก สีครีมหรือเทาอ่อนเรียบ หรือ แตกเป็นแผ่น เปลือกในสีชมพูหรือสีแดง ไม้มียางขาว หรือน้ำเลี้ยง ใบ กว้าง 3 ถึง 10 ซม. ยาว 6-12 ซม. รูปรีแกมรูปไข่ขอบขนานหรือกึ่งรูปไข่กลับ ปลายทู่และ เป็นแฉ่งเล็กน้อยโคนแหลม ไม่จักซี่ฟันและไม่มีต่อม ที่ขอบใบ ใบแก่คล้ายหนัง เกลี้ยงทั้งสองด้าน ด้านล่าง มีนวล เส้นใบเห็นชัดทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 1 ถึง 2.5 ซม. หูใบยาวประมาณ 1 มม. ดอก สีเขียวอ่อนหรือ สีเขียวแกมเหลืองอ่อน ดอกสมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อ หลวม ก้านช่อดอกยาว 5-8 ซม. แขนงแรกออกเป็นคู่ ก้านดอกยาวประมาณ 0.5 ซม. ดอกรูปแฉ่งเห็นเยื่อ กลีบเลี้ยง 5 กลีบยาวประมาณ 5 มม.(ยาวได้ถึง 10 มม.ในผล) รูปรีกว้าง ปลายกลม ขอบใส เกสรตัวผู้มี 10 อัน ติดกับจานฐานดอกนุ่มสีส้ม ยาวได้ถึง 20 มม. ก้านชูอับเรณูสีขาว อับเรณูสีส้ม ก้านเกสรตัวเมียมี 1 อัน ยาว 15 - 20 มม. ยาวเกือบเท่าเกสรตัวผู้ ผล ยาว 3-4.5 ซม. รูปรีแคบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยงติดแน่น กลีบดอกอยู่ที่โคน แต่ละซี่ไม่แตกง่าม เมล็ดยาว 18-20 มม. มีปีกแคบที่โคนไม่มีเยื่อหุ้ม พบทั้งในป่าดิบ เดิมและป่ารุ่มที่ต่ำ มีเพียงรายงานที่พบที่จังหวัด สตูลเท่านั้น แต่บางที่อาจพบมากกว่านั้น



ข้อมูลอ้างอิง : โชนอน การ์ดเนอร์, ฟินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ 2 - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2559. 792 หน้า
ภาพประกอบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=3234>