

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น

เล็กหรือขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูง 5-20 ม. เปลือก สีครีมถึงออกชมพูถึงน้ำตาลเข้ม เรียบหรือแตกเป็นร่อง มีช่องอากาศทั่วไป เปลือกในมีเส้นใย สีครีมถึง ชมพูอมส้มหรือเหลือง มีน้ำเลี้ยงสีส้มเล็กน้อย ใบ กว้าง 4-10 ซม. ยาว 9-27 ซม. มี 2 แถว รูปรีถึงไข่กลับหรือ ใบหอกแกมขอบขนาน ปลายเรียวแหลม เล็กน้อย โคน แคบหรือเกือบกลม ยอดอ่อนมีขนคล้ายขนแกะ สีสนิม แน่น ยาว 1-1.5 มม. ใบแก่เนื้อบาง เกลี้ยงหรือมีขน เฉพาะบนเส้นใบด้านบน มีขนสีน้ำตาลอมส้มติดทนอย่าง น้อยบนเส้นใบด้านล่าง ไม่มีจุดดำ เส้นกลางใบแบนเล็ก น้อยด้านบน มีขนแล้วเกลี้ยงด้านบน เส้นใบ 7-15 คู่ แบนหรือเป็นร่องด้านบน เชื่อมเป็นวงสม่ำเสมอไปยัง ขอบใบ เส้นใบย่อยเป็นร่างแหหลวมจาง ก้านใบยาว 1-1.8 ซม. มีขน กิ่งไม่เป็นสันหรือมุม มีขนแน่น ดอก เพศผู้ ขนาด 1.5-2.5 มม. สีส้มแกมเหลือง กลิ่นหอมอ่อน ออกเป็นช่อแตกแขนง 3-4 ชั้น กว้าง 1.5-7 ซม. ยาว 3-12 ซม. ตามกิ่งได้ก้านใบ มีหลายดอก ก้านช่อดอกยาว 0.3-2.3 ซม. ก้านดอกเล็ก เรียว ยาว 1-3 มม. กลีบเลี้ยง รูปกลม จัก $\frac{1}{2}$ ของกลีบเป็น 3(4) พู อับเรณู 9-12(15) อัน เป็นกระจุกค่อนข้างกลม ปลายแบนหรือปุ่ม เมื่อตัด ขวางกลมหรือสามเหลี่ยมทู่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2-1.7 มม. อยู่บน เส้า เกสรเพศผู้เล็กเรียว ยาวประมาณ 0.5 มม. ดอกเพศเมีย ขนาดประมาณ 2.5 มม. ออกเป็นช่อมีดอกน้อย ยาว 2-6 ซม. กลีบเลี้ยงรูปรีกว้าง จัก $\frac{1}{3}$ ของกลีบเป็น 3(4) พูรังไข่มีขน ผล กว้าง 1.3-1.6 ซม. ยาว 1.5-2 ซม. ก้านผลสั้น ยาวประมาณ 0.5 ซม. เป็นช่อมี 1-5 ผล ทรงรี ไม่มีกลีบเลี้ยงที่โคน สุกสีเหลืองถึงส้ม เปลือก บาง (ประมาณ 1.5 มม.) มีขนเมื่ออ่อนแล้วเกลี้ยง ยกเว้นมีขนเล็กสันติดทนที่ใกล้โคน พบเฉพาะที่ในป่าดิบ และป่ารุ่นที่มีต้นไม้โตเต็มที่ สูงได้ถึง 200 ม.



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

