

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 30 ซม. เปลือก สีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลแดง หรือเทาเข้ม เรียบหรือแตกเป็นร่องตื้น เปลือกในสีเหลืองถึงส้ม ใบ กว้าง 5-14 ซม. ยาว 10-25 ซม. ออกตรงข้าม รูปรีถึงรูปไข่กลับ ปลายแหลม โคนแหลมถึงทู่ หรือกลม เนื้อคล้ายกระดาษหนึ่งถึงหนึ่งบาง เกือบทั้งสองด้าน เส้นใบ 4-10 คู่ เป็นร่องด้านบน ก้านใบยาว 0.5-2 ซม. ตายอดแบน ใบรูปไข่ ปลายทู่ กว้างได้ถึง 1.5 ซม. ยาวได้ถึง 2.5 ซม. ไม่มีสันตรงกลาง ร่วงเร็ว ดอก สีส้มอ่อน ดอกสมบูรณ์เพศ เป็นช่อกระจุกกลมแน่น ขนาด ± 1.5 ซม. (ผ่านกลีบดอก) มี (1)2-5 ช่อปลายกิ่งหรือง่ามใบบนๆ ก้านช่อดอกแยกกัน ยาวได้ถึง 5 ซม. แต่ละดอกมีไข่มดติดกัน พุกสืบเลี้ยงมี 5 พู ยาว ± 1 มม. ปลายพู่ มีขนสีน้ำตาลแน่น กลีบดอกรูปแตรแคบ หลอดกลีบเล็ก ยาว 3-4 มม. ปลายเป็น 5 พู ยาว 1-1.5 มม. บิดในตาดอก เกือบอัดแน่น ยาว ± 1 มม. ไม่มีก้านชูอับเรณู ติดที่ฐานบนหลอด โผล่พ้นหลอด ดอกเล็กน้อย ก้านเกสรเพศเมีย มียอดเกสร รูปลูกข่าง โผล่พ้นกลีบดอก ± 4 มม. ผล เป็นกระจุกกลมแน่น ขนาด 1-2.5 ซม. ก้านช่อเล็กยาวได้ถึง 5 ซม. แข็ง ผิวมีตุ่มหรือมีรูตื้น ผลย่อยเชื่อมติดกัน แก่ไม่แตก เมล็ดรูปไข่หรือรูปรี ไม่มีปีก พบในป่าดิบ สูงได้ถึง 600 ม. บางทีพบในพื้นที่พรุ จ. พังงา นครศรีธรรมราช ตรัง นราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพใบ : <http://www.natureloveyou.sg/Nauclea%20officinalis/Main.html>

ภาพผล : <http://www.herbarium.gov.hk/PublicationsPreface.aspx?BookNameId=1&ContentId=68&SectionId=3>