

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้นขนาดเล็กถึงกลาง ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 25 เมตร บางที่มีพูพอนสั้น เปลือก สีเขียวอมเทาถึงสีน้ำตาลอมเทาเข้ม เกลี้ยงหรือแตกสะเก็ดเปลือกในสีเหลืองอ่อน ใบ รูปรีถึงขอบขนานหรือรูปไข่แคบ กว้าง 4-9 ซม. ยาว 10-20 ซม. ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนแหลม ค่อนข้างเบี้ยว ขอบเรียบ พบบางที่จักใกล้ปลาย กิ่งอ่อนมีขนเส้นไหมสีน้ำตาลอมเหลือง แน่น ใบแก่คล้ายหนัง เกลี้ยง หรือมีขนบนเส้นใบหลักด้านล่าง เส้นใบหลัก 1 เส้นออกจากโคนใบ เส้นใบข้าง (8)10-16 คู่ ค่อนข้างตรงและขนานกัน โคนแต่ไม่เชื่อมกันใกล้ขอบใบ แบนและเป็นร่องด้านบน นูนชัดด้านล่าง เส้นร่างแหเป็นชั้นบันได งามด้านบน ชัดด้านล่าง ก้านใบยาว 0.5-1.2 ซม. มีขนเส้นไหม ตายอดรูปไข่แคบหรือรูปกรวย ยาว 1-3 ซม. ขนแน่น หุ้มด้วยหูใบ 1 คู่ที่ซ้อนกัน ทั้งรอยแผลเป็นวงแหวน ดอก ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ต่างช่อบนต้นเดียวกัน ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อแตกแขนงเล็กเรียว ห้อยลง ยาวได้ถึง 8 ซม. มีถึง 100 ดอก กลีบรวม (4)5 กลีบ ยาวประมาณ 2 มม. โคนเชื่อมกัน ด้านนอกมีขนแน่น เกสรเพศผู้ (4)5 อัน ยาวประมาณ 2 มม. ติดตรงกับกลีบดอก รังไข่เป็นหมันลดรูปลงมาก ดอกเพศเมีย ออกเป็นช่อไม่แตกแขนงหรือแตกแขนงกว้าง ยาวได้ถึง 2.5 ซม. มี 2-10 ดอก กลีบรวมคล้ายดอกเพศผู้ แต่แคบกว่า ไม่มีเกสรเพศผู้เป็นหมัน รังไข่ยาว 1.5-3 มม. แบน ทรงแจกันคอยาว มีขนเส้นไหมแน่น เกสรเพศเมีย 2 อัน เล็กเรียว ยาว 2-10 มม. ดอกเพศเมียออกเป็นช่อแน่นกว่า ยาว 2-10 ซม. มีขนละเอียดสีสนิมแน่น กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 6 มม. เกสรเพศผู้ลดรูป เกสรเพศเมียเกลี้ยง ผล ออกเป็นช่อ ยาวได้ถึง 5 ซม. มี (3)5-8 ผล ส่วนมากออกเป็นช่อคู่ที่ง่ามใบ ทรงแจกัน คอยาว กว้าง 0.5-0.8 ซม. ยาว 0.7-1.2 ซม. แบน ปลายมีก้านเกสรเพศเมียคล้ายเส้นด้าย มีขนละเอียดเมื่ออ่อน สีส้มขุ่นและค่อนข้างเรียบเมื่อสุก เนื้อบางนุ่ม ผนังผลชั้นในแข็งใหญ่ พบทั่วไปในป่าดิบเดิมหรือป่ารุ่น สูง 1500 ม.

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ปานาคดี เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : <http://tropical.ferns.info/image.php?id=Gironniera+nervosa>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

