



Chrysophyllum roxburghii G.Don

SAPOTACEAE

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงกลาง สูงได้ถึง 26 ม. โคนเป็นร่อง เปลือก สีน้ำตาลอมเทาถึงออกดำเรียบหรือ แตกเป็นร่องตื้น ใบ กว้าง 1.5-5 ซม. ยาว 5-12 ซม. ออกสลับ ค่อนข้างแบนระนาบเดียว ออกห่างๆ รูปใบหอกแกมขอบขนาน ปลายเรียวแหลม โคนแหลม ค่อนข้างเป็นรูปลิ้ม เนื้อบางคล้ายกระดาษ ด้านบนเกลี้ยง มีขนสีน้ำตาล อดัม้ แล้วเกลี้ยงทั้งสองด้าน (ขนมักติดแน่นบนเส้นใบด้านล่าง) เส้นใบ 12-37 คู่ ตรงและขนานกัน เป็นวงและเชื่อมกันเป็นเส้นขอบใบเล็กเรียว เส้นใบย่อยเป็นร่างแหละเอียด/ขนาน จาง ไม่มีหูใบ กิ่งเล็กเรียว กิ่งอ่อนมีขนละเอียดสีสนิม ดอก ออกเป็นกลุ่ม มี 5-45 ดอก ออกตามง่ามใบหรือใต้แผลใบ ก้านดอกยาว 2.5-6 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ยาว 1.5 มม. กลีบดอกยาว 2.5 มม. ปลายมี 5 พู เกสรเพศผู้สมบูรณ์ 5 อัน ไม่มีเกสรเพศผู้เป็นหมัน รังไข่มี 5 ช่อง มีขน ยอดเกสรเพศเมียเล็กไม่จักเป็นพู ผล กลม ขนาด 2.5-3.8 ซม. เป็นสันตื้น มีขนละเอียดสีทองเมื่ออ่อน สีเขียวสดถึงสีออกเหลืองอ่อน เมื่อสุกเกลี้ยง เมล็ด 1-5 เมล็ด พบปลูกทางเหนือของมาเลเซีย ไม่พบในไทย



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561.
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

