

ไม้ต้นเล็ก ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 16 เมตร เรือนยอดแผ่ แตกกิ่งด้านข้าง ต้นแก่โคนเป็นร่องหรือมีพูพอนเล็ก เปลือกสีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลเทา เรียบถึงแตกออกเป็นสะเก็ดเล็ก ใบกว้าง 2-7 เซนติเมตร ยาว 5-16 เซนติเมตร ออกตรงข้าม รูปรีถึงแกว่งกลับ ปลายแหลมหรือโคนแคบ เนื้อคล้ายหนังบาง เกลี้ยงด้านบน ด้านล่างมีขนโดยเฉพาะบนเส้นใบ เส้นใบ 7-10 คู่ ทำมุมฉากกับเส้นกลางใบ จากทั้งสองด้านหลุดกลีบดอกยาว 5-8 มิลลิเมตร ก้านใบยาว 0.5-1.5 เซนติเมตร หูใบเล็ก รูปสามเหลี่ยม ร่วงเร็ว ดอก สีเหลืองอ่อนถึงออกส้ม ดอกเพศเดียว มีดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ต่างต้น ดอกเพศผู้ ออกเป็นช่อแตกแขนง(ช่อกระจุกม้วนขด) ที่ง่ามใบ มีดอกไม่น้อยกว่า 9 ดอกบนก้านช่อดอกเล็กเรียว ยาว 0.5-2 เซนติเมตร ดอกเพศเมียออกเป็นช่อก้านยาวคล้ายกับเพศผู้ หรือมี (1)3-5 ดอก(ดูด้านล่าง) ไม่มีก้านดอก กลีบเลี้ยงเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 มิลลิเมตร ปลายเป็นซี่ฟันสามเหลี่ยม 4 ซี่ ยาวไม่เกิน 1 มิลลิเมตร กลีบดอกมีหลอดกลีบรูปทรงกระบอกแคบถึงกึ่งรูปกรวย มีขนละเอียดด้านนอก ด้านในเกลี้ยง ปลายจักเป็นแฉก 4(8) แฉก ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ไม่ซ้อนกันในหลอดดอก ดอกบานทางหรือโค้งกลับ อับเรณู 4 อัน ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร ไม่มีก้านชูอับเรณู ติดรอบคอหลอด โผล่พ้นหลอดกลีบเล็กน้อยในดอกเพศผู้ ก้านเกสรเพศเมียยาว 5-7 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมียเป็นแถบแคบมี 4 อัน พ้นหลอดดอกในดอกเพศเมีย ยอดเกสรเพศเมีย ไม่เจริญในดอกเพศผู้ ผล กว้าง 1-1.2 เซนติเมตร ยาว 0.8-1 เซนติเมตร เมื่อสด(แห้งขนาด 5-7 มิลลิเมตร) กลมหรือรูปไข่ มีกลีบเลี้ยงติดทนที่ปลาย 4 พู สีเขียวอ่อน มีขนสีเทาเมื่ออ่อน เกลี้ยงและสีม่วงอมแดงเมื่อสุก เมล็ดมีผนังแข็งหุ้ม ภายในมีหลายเมล็ด พบในป่าดิบที่สูง ตามที่โล่งบนสันเขาและใกล้ลำน้ำ



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน. ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี