

ไม้ต้นขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบ โคนมีพูพอนสั้น เปลือกสีน้ำตาลอมเทา แตกเป็นร่องลึกและเป็นแผ่น เปลือกในเป็นชั้นสีน้ำตาลอมส้มและเหลือง ใบ เล็ก รีแคบถึงรูปใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 1.5-4 ซม. ยาว 4-10 ซม. ปลายแหลมหรือเรียวแหลม ยอดบาก โคนรูปลิ้ม ขอบเป็นคลื่น ใบแก่เป็นมันด้านบน เกลี้ยงหรือมีเกล็ดเป็นขุยด้านล่าง ใบแห้งสีเหลืองช้ำถึงสีน้ำตาลแดง เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน เส้นคมด้านล่าง เส้นใบเล็ก 14 คู่โค้งแบนด้านบน เส้นใบย่อยห่าง ก้านใบยาว 1-2 ซม. เล็กเรียว หูใบรูปใบหอก กว้างถึง 3 มม. ยาว 10 มม. ร่วงเร็ว กิ่งเมื่ออ่อนมีขุย ต่อไปเกลี้ยง ดอกสีขาวถึงเหลืองอ่อน ด้านในมีแต้มสีชมพูขนาด 1 ซม. เป็นช่อแตกแขนงยาวถึง 10 ซม. ตามง่ามใบและที่ปลายยอด ดาดอกรูปไข่กว้างถึง 3 มม. ยาวถึง 5 มม. กลีบเลี้ยงมีพुरुปสามเหลี่ยมแคบ กลีบดอกรูปใบหอกแกมรูปไข่ เกสรเพศผู้ 25 อัน อับเรณูรูปขอบขนานปลายมีรยางค์คล้ายเส้นด้าย เกลี้ยง ยาวเป็น 2-3 เท่าของอับเรณู ปลายมีขน รังไข่รูปไข่แคบ เรียวไปยังก้านเกสรเพศเมีย ยาว 1.5 เท่าของรังไข่ ผล ปีกยาว 3 ปีก กว้าง 1-1.3 ซม. ยาว 4-7 ซม. แบนคล้ายเข็ดขัด เกลี้ยง อีก 2 ปีกสั้น กว้าง 0.5 ซม. ยาว 2-3(5) ซม. ผลรูปไข่กว้าง 0.8 ซม. ยาว 1.5 ซม. ปลายสั้น เกลี้ยง โคนปีกหุ้มครึ่งผล พบตามไหล่เขาสูง 350 ม.



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอน ฟินคา สิทธิสุนทร กองกานตา ชยาฤดีไม้อาภาคไต้ เลม - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

