

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็กทรงพุ่ม ไม้ผลัดใบ ไม่มีหนาม มีกลิ่นหอมอ่อนหรือไม่มี กิ่งอ่อน กลุ่มตาใบ และช่อดอกมักมีขนสั้นสีสนิม ใบ เดี่ยว มี 3 ใบหรือใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ มีใบย่อย 3 ใบ ยาวไม่เกิน 10 เซนติเมตร แบนหรือเป็นแอ่งเล็กน้อยด้านบน ขุนเล็กน้อยด้านล่าง ไม่มีก้าน มีเส้นใบ 6-16 คู่ ออกสลับ ยอดแหลม เนื้อคล้ายกระดาษหนังหรือแผ่นหนัง ขอบเรียบ ไม่เป็นปึก ดอก เล็ก สีขาวหรือเขียวอ่อน สมบูรณ์เพศ เป็นช่อดอกแคบ กลีบเลี้ยง 4(5) กลีบ โคนเชื่อมกัน ช้อนกัน มีต่อม กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่หรือรี ช้อนกัน เกสรเพศผู้ มี (8)10 อัน ไม่เท่ากัน อับเรณูเล็ก มีต่อมน้ำมันขีดด้านหลังและที่ปลาย ก้านชูอับเรณูปลายแคบสั้น โคนค่อนข้างแบน จานฐานดอกคล้ายวงแหวนจักเป็นพูเล็ก รังไข่ 3 ช่อง รังไข่เกลี้ยงหรือมีขน มีก้านล่ำ ก้านเกสรเพศเมียสั้นหนา ยอดเกสรเพศเมียคล้ายจาน ผล กลมถึงรูปไข่หรือรี ขนาด 0.8-1.5 เซนติเมตร ปลายมีก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ ผลมีเนื้อหลายเมล็ด มีจุดต่อม แท่งหรือฉ่ำน้ำ เนื้อเป็นเมือก ไม่มีผนังกันด้านใน กิ่งโปร่งแสง สุกสีขาวถึงเหลืองหรือแดง 1-2(3) เมล็ด



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชยอน, ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

