

Orophea enterocarpa Maingay ex Hook.f. & Thomson

กล้วยค่าง

วงศ์ ANNONACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น สูง 10 ม. เปลือก เรียบสีน้ำตาลเข้ม เปลือกในสีครีมถึงสีน้ำตาลอมส้ม ใบ ขนาด และรูปร่างต่างกัน ตั้งแต่รูปไข่ถึงรี หรือรูปใบหอกแกมไข่กลับ กว้าง 3-5 ซม. ยาว 6-12 ซม. ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนแหลมหรือทู่ เนื้อบางคล้ายกระดาษ ด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างสีเขียว เกือบทั้งสองด้าน เส้นใบ 6-8 คู่ จางด้านบน หนูนด้านล่าง เส้นใบย่อยละเอียดและจางมาก ก้านใบยาวประมาณ 3 มม. กิ่งเล็กเรียวสีน้ำตาลเข้ม เกือบแมงออ่อน ดอก สีขาวถึงสีครีมมีแต้มแดงด้านใน ออกเดี่ยวหรือเป็นช่อ มี 2-3 ดอก ก้านช่อดอกแข็ง ยาว 0.5-1 ซม. ตามซอกใบหรือเหนือซอกใบ ก้านดอกเรียวยาว 1-3 ซม. ค่อนข้างเกลี้ยง อดดอกแหลม กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาวประมาณ 3 มม. ปลายแหลม มีขนละเอียดสีขาวด้านนอก กลีบดอกวงนอกรูปไข่หรือรูปรี ยาว (5)10-15 มม. ปลายแหลม ไม่มีก้านกลีบ บางคล้ายกระดาษ มีเส้นหลายเส้นชัด มีขนสั้นหรือค่อนข้างเกลี้ยง วงในยาวกว่าเล็กน้อยรูปเหลี่ยมเพชร ปลายแหลมโคนมีก้านเล็กเรียวยาวกว่าตัวกลีบเชื่อมติดกันตามขอบบน ไม่บานออกเมื่อแก่ เกือบ ด้านในมีต่อมน้ำหวานสีแดง ขอบไม่เป็นคลื่น ไม่มีเนื้อเยื่อสีด้าลอมเมื่อแห้ง เกสรเพศผู้ 6(12) อันติดสลับกับเกสรเพศผู้เป็นหมันคล้ายต่อม 6 อัน เกสรเพศเมียมีขน 6 อัน รูปทรงกระบอก มีประมาณ 6 ออูล ผล ทรงกระบอกแคบ กว้าง 0.5-1 ซม. ยาว 4-9 ซม. ปลายแหลมทั้งสองด้าน ไม่มีสันตามยาว มีตุ่มเล็กน้อย เมื่ออ่อนมีขนกำมะหยี่สีน้ำตาลเข้มแน่น เมื่อสุกสีน้ำตาลอมเทา ก้านผลยาวประมาณ 0.7 ซม. มี 4-6 ผล ค่อนข้างคอดระหว่างเมล็ด เกือบ เมื่อสุกสีส้มถึงสีแดงเป็นมัน มี 6 เมล็ดรูปขอบขนาน พบทั่วไปในป่าดิบ สูงถึง 500 ม.



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ฟินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

