

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็ก สูงได้ถึง 10 เมตร เปลือก สีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลออกเทา ใบ มี 3 ใบหรือ ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ มีใบย่อย 2-3(4) คู่ ออกสลับถึงกึ่งตรงข้าม กว้าง 2-6 มิลลิเมตร ยาว 5-17 เซนติเมตร พบน้อยที่ใหญ่กว่า กว้างได้ถึง 10 มิลลิเมตร ยาวได้ถึง 26 เซนติเมตร มักห้อยลง รูปไข่ถึงรี ปลายเรียวแหลมยอดทู่ พบน้อยยอดบาก โคนกลมหรือแหลม ไม่เบี้ยว ขอบเรียบ ยอดอ่อนสีน้ำตาลอมชมพู ใบแก่คล้ายหนังบาง เติบโตเป็นมันด้านบน เกือบทั้งสองด้าน มักมีตุ่มขนที่ซอกเส้นใบ เส้นกลางใบขนกลม คมด้านบน เส้นใบ 8-11 คู่ เป็นวงเชื่อมกันใกล้ขอบใบอย่างน้อยในครึ่งบน เส้นใบย่อยเล็กเป็นร่างแหชัดเจน ดอก ขนาดประมาณ 0.3 เซนติเมตร สีขาวถึงเขียวอ่อน สมมาตร แยกเพศ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ต้นเดียวกัน ออกเป็นช่อกระจุกไม่แตกแขนงหรือแตกแขนงบ้าง ยาว 8-25 เซนติเมตร ตามกิ่งใต้รอยแผลใบหรือที่ง่ามใบ (พบน้อยที่ออกที่ปลายกิ่ง) ก้านดอกสั้น กลีบเลี้ยงปลายจัก 2/3-3/4 ของกลีบเป็นพู 5 พู รูปสามเหลี่ยม ยาว 1-2 มิลลิเมตร สีเขียว เกือบหรือมีขนเล็กน้อยที่ครึ่งล่างด้านนอก ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้ 8 อัน (พบน้อย 6-9 อัน) ก้านชูอับเรณูเกลี้ยง ยาวได้ถึง 4 มิลลิเมตร ล้อมรอบด้วยจานฐานดอกเกลี้ยงเป็นวง รังไข่มี 3 ช่อง เกือบหรือมีขน ยอดเกสรเพศเมียจักเป็นพู ผล ยาว 0.7-1.8 เซนติเมตร สีเขียวมัน สุกสีแดง คล้ายลูกแพร์ โคนคล้ายก้านแคบ ผลอ่อนเป็นมุม 3 มุม แก่แตก เกือบทั้งสองด้าน มี 1 เมล็ด ยาวได้ถึง 7 มิลลิเมตร สีน้ำตาลเข้มหรือสีดำอมม่วงมีเยื่อหุ้มบาง พบอยู่ทั่วภาคใต้ ในป่ารุ่นเปิดหรือไม้ชั้นเรือนยอดของป่าดิบเดิม สูงได้ถึง 800 เมตร มักขึ้นด้านหลังป่าชายหาดและป่าชายเลน



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน, ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี