

Xerospermum noronhianum (Blume) Blume

คอแลนเขา(คอเหี้ย)

SAPINDACEAE

ชื่ออื่น : คอแลน หมักคอแลน กระตูก้าง คอเหี้ย ช้างน้าว ช้างลวน แลนบาน สีลามันป่า

ไม้ต้น สูง 25-40 เมตร ผลัดใบ เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาลเทาถึงดำ บางครั้งร่อนเป็นสะเก็ดใหญ่ มีช่องระบายอากาศ ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงสลับ มีใบย่อย 1-2(-3) คู่ เรียงตรงข้าม บางครั้งเยื้องกัน แผ่นใบย่อยรูปรีหรือรูปรีแกมขอบขนาน กว้างถึง 3 เซนติเมตร ยาว 5-15 เซนติเมตร ปลายมนถึงเรียวแหลม โคนใบป้านถึงแหลม ผิวใบค่อนข้างเกลี้ยงทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 4-6 มิลลิเมตร ดอกเล็กมาก สีขาวหรือเหลือง กลิ่นหอม ดอกแบบช่อแยกแขนง ออกเป็นช่อตามปลายกิ่งและตามง่ามใบใกล้ยอด ช่อดอกยาวถึง 25 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 4 กลีบ รูปไข่กลับ มีขน เกสรตัวผู้ 8 อัน สีขาวมีขน เกสรตัวเมียสีเขียวอ่อน ก้านดอกยาว 2 มิลลิเมตร โคนก้านดอกมีใบประดับสีเขียวรูปสามเหลี่ยมเล็กๆ ผลรูปรีถึงค่อนข้างกลม กว้าง 1.5-5 เซนติเมตร ยาว 2-5 เซนติเมตร เปลือกเป็นตุ่มทั่วทั้งผล เมื่อสุกสีเหลืองแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือน้ำตาล มีเปลือกหนาคัลลายแผ่นหนัง เมล็ดมีเยื่อหุ้ม พบในป่าดิบ ป่าพรุ ป่าชายหาด บนพื้นที่ราบถึงที่ลาดชัน และตามสันเขา ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 300-1,500 เมตร




Photo by Aroon Sinbumroong

ข้อมูลอ้างอิง : http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant&view=showone&id=1603

ภาพประกอบ : ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพผล : Aroon Sinbumroong



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

