

ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 15 ถึง 20 เมตร ไม่มีพุ่มพอน เปลือกสีน้ำตาลอมเทา แตกหยาบ เปลือกในสีเหลืองอ่อน มีซีกสีเข้ม นุ่ม เป็นเม็ดยาว ใบ กว้าง 3-6 ซม. ยาว 10 ถึง 16 ซม. รูปขอบขนานแกมรีถึงรูปไข่ แฉกปลายเรียวแหลม โคนรูปกลมกว้างถึงกลม คนข้างเบี้ยว ขอบไม่จัก มีซี่ฟันตื้นห่างๆ ในครึ่งบนขอบมักโค้ง ใบแก่คล้ายหนังบาง เกลี้ยงมันด้านบน ด้านล่างสีเขียวอมเทาขุ่น มีขนสั้นหยิกเป็นชั้นหนา อาจมองคล้ายขนเกลี้ยง เส้นกลางใบเป็นร่องหรือค่อนข้างแบนด้านบน สีออกม่วงเมื่อแห้ง เส้นใบ 8-14 คู่ ขนานกัน โค้งเชื่อมกันใกล้ขอบล่างๆ ด้านล่างเป็นสัน เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันไดไม่สม่ำเสมอ ละเอียดและแน่น ไม่เห็นเส้นใบย่อยลงไป ก้านใบเรียวยาว 0.5 ถึง 1.3 cm เกลี้ยง เป็นร่องด้านบน ดอก ดอกตัวผู้เป็นช่อเล็กเรียวกิ่งแตกแขนง ยาว 10 ถึง 20 ซม. ก้านดอกอัดแน่น ช่อดอกตัวเมียใหญ่กว่าไม่แตกแขนง ผล กว้าง 1.8 ถึง 2.5 ซม. ยาว 2.5 ถึง 3.5 ซม. ออกเป็นช่อตั้งตรง ยาว 15-20 ซม. รูปไข่กลับเบี้ยว หรือคล้ายผลแพร์ แบนและโค้งไปยังกิ่งด้านหนึ่ง กาบหุ้มผลหนา 3-4 มม. ปกคลุมด้วยตุ่มแข็งทรงพีระมิดหนาแน่นหรือกระจาย หรือมีหนามใหญ่สั้น ยาว ได้ถึง 3 มม. ไม่มีก้านผล หรือมีก้านยาวได้ถึง 3 มิลลิเมตร แก่ไม่แตก ภายในกามีผลเดี่ยว กว้าง 1.4 ถึง 1.8 ซม. ยาว 2 ถึง 2.8 ซม. รูปไข่กลับไม่เรียบหรือคล้ายผลแพร์ ผลอยู่ในกาบหุ้มผลทั้งผล พบทั่วไปในป่าดิบที่ต่ำ หรือป่าในที่สูง สูง 50 ถึง 1,200 เมตร ตั้งแต่จังหวัดระนองถึงนราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ ฟินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์ฉบับใหม่. 2559. 792 หน้า.

ภาพประกอบ : ภาพผล : <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/15225169529/in/photostream/>

ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

