

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงถึง 40 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 ซม. พุ่มสูงถึง 2 ม. เปลือกสีน้ำตาลอมเทา มีช่องอากาศ เปลือกแตกเป็นสะเก็ด เปลือกด้านในสีน้ำตาลอมเหลือง กิ่งเป็นมุม เมื่อยังอ่อนมีขนเป็นผงแป้งสีน้ำตาลแดง ไม่มีหูใบ ใบรูปขอบขนาน รูปรีหรือรูปไข่ ขนาด 4.5–10.5 x 3–5.5 ซม. มีขนหยากประปราย ด้านท้องใบและเส้นกลางใบด้านหลังใบ ใบย่อย 3–4 คู่ ก้านดอกและก้านใบมีขนเป็นผงแป้งสีน้ำตาล โคนใบกลมถึงรูปหัวใจ ขอบหยักซี่ฟันละเอียดถึงปลายใบ ปลายใบมนหรือกลม เส้นกลางใบด้านหลังใบแบน เส้นแขนงใบ 8–15 คู่ เส้นแขนงใบด้านท้องใบขนานติด ด้านหลังใบแบนราบ เส้นแขนงใบย่อยแบบร่างแหขนานชิดด้านท้องใบ ก้านใบย่อย ยาว 2–3 มม. มีขนเป็นผงแป้ง ดอก(เพศเมีย) สีเหลืองอมน้ำตาล ออกคล้ายช่อกระจุกแยกแขนง กลีบดอกคล้ายก้านกลีบ ผลรูปไข่แหลม มีขนปกคลุม ขนาด 4–5 x 2–2.5 ซม. พบในป่าดงรัง ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลจนถึง 500 ม.



อ้างอิง : Soepadmo, E. Saw, L. G. and Chung, R. C. K. (1995). Tree flora of Sabah and Sarawak volume 1. Malaysia: Forest research institute Malaysia.

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

