

## กรมป่าใหญ่

## วงศ์ PHYLLANTHACEAE

ชื่อพื้นเมือง :



**ไม้พุ่ม** หรือไม้ต้นเล็ก ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 15 ม. เรือนยอดเปิดและกิ่งก้านแผ่กระจาย เปลือกสีเทาอ่อนหรือสีน้ำตาล แตกเล็กน้อย ใบ กว้าง 2-8 ซม. ยาว 5-23 ซม. รูปไข่หรือรี ปลายแหลมสั้น โคนกลมหรือรูปลิ้น ขอบเป็นคลื่นหรือซี่ฟันตื้นและมีต่อม ใบแก่ด้านล่างมีต่อมเล็กที่โคน และต่อมรูปจานห่างจากขอบใบ (อยู่ในวงเส้นใบ) เส้นใบ 8-11 คู่ ฐานด้านล่าง ก้านใบยาว 0.7-2.3 ซม. ป่องชัดที่ปลายทั้งสองด้าน หูใบรูปไข่แคบ ยาว 6-9 มม. ร่วงเร็ว ดอกเพศผู้สีครีมหรือสีเหลืองสด ขนาด 0.7-1 มม. ออกเป็นช่อยาว 1.6-4.6 ซม. มีดอก 6-10 อยู่ห่างกันบนแกนกลางดอก ดอกไม่มีก้านดอก มี 1-5 ช่ออยู่ด้วยกันตามซอกใบ กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ ยาว 0.7-1 มม. เกสรเพศเมีย มี 2 อัน ยาว 0.5-1.2 มม. โพล์พันกลีบเลี้ยงเล็กน้อย รังไข่เป็นหมัน เห็นไม่ชัด ดอกเพศเมีย ขนาด 3-5 มม. ออกเป็นช่อยาว 0.3-1.1 ซม. มีถึง 11 ดอก เรียงกันแน่นบนแกนกลางดอก ออกเป็นช่อ 1-3 ช่ออยู่ด้วยกันตามซอกใบ ดอกไม่มีก้าน กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ ยาว 0.7-1 มม.แผ่กว้าง บางทีมีเกสรเพศผู้เป็นหมัน 2 อัน รังไข่ 2(3) ช่อ ยอดเกสรเพศเมีย ยาว 0.8-2 มม. ปลายจักเป็นง่ามลึก ผล ขนาด 0.9-1.3 ซม. รูปไข่ถึงรีหรือขอบขนาน ปลายมีจงอยเล็กน้อย โคนแคบเมื่ออ่อน มีขนกระจาย แก่แตกเป็น 2(3) ส่วน แต่ละส่วนและ แกนกลางผลมีเส้นไหมเล็กน้อย เมล็ด 1(2) เมล็ด ขนาด 7-8 มม. เนื้อสีส้มพบตามป่ารุ่นหรือป่าที่ถูกทำลาย บางทีพบตามเขาหินปูน

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

