

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงกลาง สูง 9-20(30) ม. เปลือก สีเทาอ่อนถึงสีน้ำตาล เรียบถึงแตกเป็นร่องเล็กๆ เปลือกในสีน้ำตาล ใบ กว้าง 3-4.5 ซม. ยาว 8-15 ซม. รูปขอบขนานแกมรีถึงรูปใบหอก ปลายเรียวแหลม มักโค้งไปด้านเดียว โคนห่อและค่อนข้างเบี้ยว ขอบไม่จัก ใบแก่คล้ายหนัง สีเขียวเข้มเป็นมันด้านบน ด้านล่าง สีเขียวอมเทาอ่อน เกือบทั้งสองด้าน เส้นกลางใบนูน ด้านล่าง เส้นใบ 7-10 คู่ โค้งแต่ไม่โค้งขอบ เส้นใบ ย่อเป็นขั้นบันไดไม่สม่ำเสมอทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 0.5-1.5 ซม. เป็นรอยด้านบน เมื่ออ่อนมีขนละเอียด แล้วเกลี้ยง ดอก ดอกเพศผู้เป็นช่อเรียวแตกแขนง กว้างยาว 7-14 ซม. ดอกเพศเมียเป็นช่อใหญ่ ยาว 6-10 ซม. ผล ยาว 2.5-4 ซม. ออกเป็นช่อใหญ่ลำยาว 10-15 ซม. ไม่มีก้าน ผล กลม มีกลุ่มหนามใหญ่โค้งแน่น ยาว 5-8 มม. ซึ่งโคนเชื่อมติดกัน ภายในกาบหุ้มเมล็ดมีผลเดี่ยว กว้าง 1-2 ซม. ยาว 1.5-3 ซม. รูปไข่รอยแผลเป็นแบนอยู่ที่โคน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.2 ซม. มีขนเส้นไหมที่ปลาย

-พบในป่าดิบที่ต่ำ สูงได้ถึง 400 ม. ตามที่โล่งหรือใกล้น้ำ จ. ชุมพร ถึงสงขลา ยะลา นราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง: ไข่มอน การค้นคว้า พินดา สิงห์สุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้เล่ม 2 - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2559, 792 หน้า
ภาพประกอบ:ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี