

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น สูง 10-22 ม. เปลือก สีน้ำตาลอมเทา ค่อนข้างเรียบ เปลือกในสีน้ำตาลอมแดงมีขีดสีอ่อน ใบ กว้าง 3-6 ซม. ยาว 10-20 ซม. รูปขอบขนานถึงรูปใบหอก ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนทู่หรือรูปลิ้น เบี้ยวเล็กน้อย ขอบไม่จัก ใบแก่คล้ายหนัง ด้านบนสีเขียวเข้มขุ่น ด้านล่างสีเขียวอมเทาอ่อนหรือมีนวล เกือบทั้งสอง ด้าน เส้นกลางใบนูนด้านบน เส้นใบ 7-11 คู่ ค่อนข้างเป็นร่องด้านบน นูนด้านล่าง เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันไดชัดเจนด้านล่าง ก้านใบเรียวยาว 1-2 ซม. เกือบ ดอก ออกเป็นช่อตั้ง ยาว 6-20 ซม. ที่ปลายกิ่งและตามซอกใบบนๆ ไม่แตกแขนง หรือพบน้อยที่แตกแขนง (ช่อดอกเพศผู้) ผล ยาว 4-6 ซม. ออกเป็นช่อแข็ง ยาว 15-30 ซม. ผลออกเป็นกลุ่มมี 2-3 ผล ไม่มีก้าน ทรงกลมไม่เรียบ หรือเป็น 2 พู ปกคลุมด้วยหนามแข็งแตก กิ่งโค้งหนา แต่ยังคงเห็นผิวผลระหว่างหนามด้านในมีขนกระจาย แก่แตกไม่เรียบ ภายในกาบหุ้มผลมี 1-3 ผล รูปไข่เบี้ยว ค่อนข้างโค้งไปทางด้านเดียว มีขนแน่นใกล้ปลาย มีรอยแผลเป็นใหญ่ ยาวกว่าความสูงผล

พบทั่วไปในป่าดิบที่ต่ำ สูงได้ถึง 300 ม. จ. ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต ตรัง



อ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ ฟินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้เล่ม 2 - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : <http://crassa.cocolog-nifty.com/blog/2014/11/castanopsis-pie.html>