

Lithocarpus hendersonianus A.Camus

ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 15-25 เมตร เปลือก สีเทาถึงสีออกดำ เรียบหรือแตกตื้น ใบ กว้าง 3.5-6 เซนติเมตร ยาว 9-16 เซนติเมตร รูปขอบขนานแกมรีถึงกึ่งรูปไข่กลับ ปลายแหลมถึงทู่ โคนรูปปลีมน ขอบโค้ง ใบแก่เนื้อคล้ายหนังหนา เกลี้ยงด้านบน ด้านล่างมีขนขุยสีเทาอมเหลืองอ่อนกระจาย แล้วเกลี้ยงด้านล่าง เส้นใบ 8-10 คู่ ขนานกันโค้งและค่อยๆ จางหายไปใกล้ขอบ ไม่เชื่อมกัน (หรืออาจเชื่อมกันบ้าง) เป็นร่องหรือจางด้านบน วนคมด้านล่าง เส้นใบย่อยไม่สม่ำเสมอ จางถึงขีดทั้งสองด้าน ก้านใบเล็ก ยาว 1.3-2.3 เซนติเมตร ผล กว้าง ± 1.8 เซนติเมตร (รวมกาบหุ้มผล) ยาว ± 2.2 เซนติเมตร ออกเป็นช่อยาว 12-15 เซนติเมตร ผลออกเดี่ยว ไม่มีก้านผลหรือก้านผลยาวได้ถึง 0.5 เซนติเมตร กาบรองผลรูปกรวยคว่ำถึงรูปไข่กลับกว้าง ปลายแบน โคนกลม หุ้มผลค่อนข้างมิด ยกเว้นปลาย เปลือกบางแข็ง มีวงจักละเอียด 5-7(10) วง มีขนสีน้ำตาลอมเหลือง อ่อนแน่นด้านนอก ตัวผลรูปกรวยแกมรูปไข่กว้างถึงค่อนข้างกลม เชื่อมติดกับกาบหุ้มผลมากกว่า 3 ใน 4 ของผล ทั้งรอยแผลเป็นใหญ่มากกว่า 3 ใน 4 ของความสูงผล มีนวลเมื่ออ่อนมีขนแน่นใกล้ปลาย พบน้อยในป่าดิบที่ต่ำ สูง ± 50 เมตร จังหวัดระนอง



ข้อมูลอ้างอิง : ไชมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาฤต. ไม้ป่าภาคใต้ – พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า: ภาพประกอบ
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

