

Lithocarpus cantleyanus (King ex Hook.f.) Rehder

ก่อหลับเนื้อร้าว(ก่อหลับใหญ่) FAGACEAE

ไม้ต้นสูง 10-36 เมตร ลำต้นตรง โคนมีพูพอนเล็ก เปลือก สีครีมถึงเทาอ่อนหรือน้ำตาลเทา เรียบถึงเป็นเกล็ดหรือแตกเป็นร่อง เปลือกในสีน้ำตาลถึงแดงเข้ม มีขีดแนวตั้งสีครีมไม่มาก ใบ กว้าง 4.5-7 เซนติเมตร ยาว 12-20 เซนติเมตร รูปขอบขนานแกมรี ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนรูปลิ้มกว้าง ค่อนข้างเบี้ยว โค้งตามขอบ เนื้อคล้ายแผ่นหนังแข็ง สีเขียวเข้มเป็นมันด้านบน ด้านล่างสีเขียวเทา มีขนสั้นเป็นขุยเล็กน้อยเกลี้ยงทั้งสองด้านนอกจากบนเส้นใบ เส้นกลางใบขนดทั้งสองด้าน เส้นใบ 13-16 คู่ ตรงขนานกันแล้วโค้งใกล้ขอบแต่ไม่เชื่อมกัน เป็นร่องด้านบน ฐานด้านล่าง เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันไดละเอียด ชัดด้านล่าง ก้านใบยาว 1.2-1.5 เซนติเมตร เป็นร่องด้านบนเกลี้ยง หูใบกว้าง 1-2 มิลลิเมตร ยาว 3-5 มิลลิเมตร รูปไข่หรือคล้ายสายหนัง ดอกเพศผู้เป็นช่อยาว 10-20 เซนติเมตร ดอกสมบูรณ์เพศช่อยาว 9-15 เซนติเมตร ผลรวมกาบหุ้มผล กว้าง 2.2-3 เซนติเมตร ยาว 1.5-2.5 เซนติเมตร กว้างมากกว่ายาว ออกเป็นช่อยาว 10-15 เซนติเมตร ผลออกเดี่ยว ห่างกัน กายผลใหญ่ยาวได้ถึง 0.5 เซนติเมตร กาบหุ้มผลคล้ายจานรองถ้วย ขอบแคบหุ้มผลประมาณ ¼ ของผลบางแข็ง มีวงค่อนข้างจัก 4-6 วง ขนแน่นตัวผลกว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 1-1.5 เซนติเมตร กลมแบน ปลายบวม ยอดสั้น โคนรูปหัวใจ มีรอยแผลเป็นโค้งเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ขนสีเงินแน่นเมื่ออ่อนแล้วเกลี้ยง

พบทั่วไปในป่าดิบเต็งและป่ารুন สูงถึง 800 เมตร มักพบใกล้ลำน้ำ



ข้อมูลอ้างอิง : ไชยมอน การ์ดเนอร์ พินคา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาฤๅณ ไม้ป่าภาคใต้ – พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า: ภาพประกอบ

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

