

Lithocarpus clementianus (King ex Hook.f.) A.Camus

ก่อหลับเนื้อร้าว

FAGACEAE

ชื่อพื้นเมือง

ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 10-36 ม. มีพูพอนสูงได้ถึง 3 ม. เปลือก สีเทาอ่อนถึงออกน้ำตาล แตกเป็นแผ่นหรือร่องลึก เปลือกในสีน้ำตาลอมเหลืองถึงสีชมพูหรือน้ำตาลอมแดง ใบ กว้าง 4-6 ซม. ยาว 11-18 ซม. รูปร่างขอบขนาน ปลายเรียวแหลม โคนทู่หรือแหลม ขอบค่อนข้างโค้ง ใบแก่เนื้อคล้ายแผ่นหนัง สีเขียวเข้มเป็นมันด้านบน ด้านล่างมักมีขน มีขนสั้นสีน้ำตาลอมเหลืองหรือขนสีเทาเป็นชุยแน่นเมื่อยังอ่อน แล้วค่อยๆเกลี้ยง เส้นใบเล็ก 9-13 คู่ โค้งแต่ไม่เชื่อมกันใกล้ขอบ ขัดทั้งสองด้าน เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันได จางทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 0.7-1.3 ซม. แบนด้านบน มีขนละเอียดถึงเกลี้ยง หูใบรูปไข่ กว้างประมาณ 1 มม. ยาว 2 มม. ดอกเป็นช่อ เรียบหรือแตกแขนง ยาว 5-10 ซม. ตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ผล กว้าง 3-3.5 ซม. (รวมถ้วย) ยาว 1.5-2 ซม. ออกเป็นช่อยาว 10-15(20) ซม. ผลออกเดี่ยว ไม่มีก้านหรือมีก้านยาวได้ถึง 0.5 ซม. กาบหุ้มผลรูปกรวย หุ้มผลประมาณ 1/3 ของผล มีวงหนาจัก 5-8 วง ผลกว้าง 2-3 ซม. ยาว 1-1.5 ซม. รูปกลมแหลม ปลายแบนหรือบวม ยอดสั้นโคนแบน มีรอยแผลเป็นโค้งลึก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.4-2 ซม. มีขนสีเทาเมื่ออ่อน แล้วเกลี้ยง พบในป่าดิบที่ต่ำ สูง 100-200 ม. จ.ระนอง พังงา นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ ฟินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2559 792 หน้า.

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนวิทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนวิทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

