

ชื่อพื้นเมือง

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงกลาง สูง 6-25 ม. เปลือก สีน้ำตาลถึงน้ำตาลอมเทา แตกสะเก็ดหรือเป็นเกล็ด ถึงแตกเป็นร่องลึกในอายุมากๆ หนา 1-2.5 ซม. เปลือกในสีส้มอมเหลืองถึงสีน้ำตาลอมครีมหรือน้ำตาลอมแดงเข้ม ใบ กว้าง 3-8 ซม. ยาว 10-20 ซม. อาจกว้างได้ถึง 12 ซม. ยาวได้ถึง 30 ซม. รูปร่างและขนาดแตกต่างกัน ส่วนมากรูปขอบขนานแกมรีถึงรูปใบหอก พบน้อยรูปไข่กลับปลายเรียวแหลมหรือแหลมทู่ มักโค้งเล็กน้อย โคนรูปลิ้มกว้างถึงทู่ พบน้อยโคนกลม ค่อนข้างเบี้ยว ขอบโค้ง ใบแก่เนื้อคล้ายแผ่นหนัง สีเขียวเข้มชุนหรือเป็นมันด้านบน ด้านล่างสีอ่อนกว่าเล็กน้อย มักมีขนเกลี้ยงทั้งสองด้าน เมื่อแห้งสีน้ำตาลอ่อนอมเทาทั้งสองด้าน เส้นกลางใบขนานชัดเจนด้านล่าง ด้านบนขนานเล็กน้อยหรือแบน เส้นใบเรียว 10-16 คู่ ค่อนข้างขนานกัน โค้งและมักเชื่อมกันใกล้ขอบ ค่อนข้างห่างและเป็นร่องตื้นด้านบน ขุนด้านล่าง เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันไดไม่สม่ำเสมอ ถึงเป็นร่างแหละเอียด จากทั้งสองด้าน ก้านใบเรียวยาว 1.5-3 ซม. เกลี้ยง บางทีโคนหนา หูใบกว้าง 1-2 ซม. ยาว 3-6 ซม. รูปสามเหลี่ยมแคบ กิ่งเรียวเล็ก มีช่องอากาศเล็กกระจ่าง มีขนสีน้ำตาลอมเทาเมื่ออ่อน ผล กว้าง 2-2.5 ซม. (รวมกาบหุ้มผล) ยาว 1.5-2 ซม. ออกเป็นช่อยาว 15-30 ซม. ไม่มีก้านผลหรือก้านผลใหญ่ ยาวได้ถึง 0.5 ซม. ผลออกเป็นกลุ่ม 3-6 ผลเชื่อมกันบางส่วน กาบหุ้มคล้ายจานรองถ้วย หุ้มผล $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{3}$ ของผล บางทีหนา แข็ง มีเกล็ดรูปสามเหลี่ยมเล็ก และมักจะแยกกันตรงใกล้ปลายถ้วย แต่จะเชื่อมกันหรือซ้อนกันเป็นวงไม่ชัด ไปยังโคน บางทีแยกกันทั้งหมด ตัวลูกกว้างประมาณ 2 ซม. ยาว ประมาณ 1.4 ซม. รูปไข่กว้างหรือครึ่งวงกลม ปลายมนหรือแบนหรือค่อนข้างมน ยอดค่อนข้างสั้น โคนกลม มีรอยแผลเป็นโค้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.7 ซม. สีช็อกโกแลตมันและเกลี้ยงเมื่อแก่ พบทั่วไปในถิ่นที่อยู่หลายแบบ ตั้งแต่ความสูง ระดับน้ำทะเลถึง 2400 ม. (ในภาคเหนือ) มักพบในป่ารุ่น หรือที่ถูกรบกวน จ.ระนอง ตรัง สงขลา นราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559 792 หน้า.

ภาพประกอบ : <https://stories.rbge.org.uk/archives/21409>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

