

Lithocarpus bancanus (Scheff.) Rehder

ก่อวงเอียด

FAGACEAE

ไม้ต้นสูง 10-25 เมตร เปลือก สีน้ำตาลอมเทาหรือออกเหลือง เรียบถึงป็นเกล็ดละเอียด ใบ กว้าง 4.5-6.5 เซนติเมตร ยาว 10-15 เซนติเมตร รูปขอบขนานแกมรี ปลายเรียวแหลม โคนห้หรือรูปปลีมนกว้าง ค่อนข้างเบี้ยว เนื้อคล้ายแผ่นหนังเป็นมัน เกลี้ยงด้านบน ด้านล่างมีขนสั้นสีเหลืองถึงน้ำตาลอมเทา เส้นใบ 8-12 คู่ ขนานกัน จางทั้งสองด้านหรือเห็นชัดด้านล่าง เส้นใบย่อยไม่สม่ำเสมอ จาง ก้านใบยาวประมาณ 1 เซนติเมตร เกลี้ยง หูใบรูปสามเหลี่ยม กว้างประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ผล รวมกับหุ้มผล กว้าง 1.2-1.5 เซนติเมตร ยาว 1.5-2 เซนติเมตร ออกเป็นช่อแข็งยาว 10-15 เซนติเมตร ผลออกเดี่ยว บนก้านยาว 0.3-1 เซนติเมตร กาบหุ้มผลคล้ายจานรองถ้วย มีขอบบางแข็งหุ้มประมาณ 1/5-1/4 ของผล มีวงไม่เป็นซี่ฟันค่อนข้าง จาง 4-6 วง ด้านในมีขนสีเทาเงิน ตัวผลรูปไข่ ปลายแหลม โคนกลม มีรอยแผลเป็นโค้งลึก เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 1 เซนติเมตร มีขนสีเทาอ่อนเมื่อยังอ่อน แล้วเริ่มเป็นสีน้ำตาลขุ่นและเกลี้ยง พบในป่าดิบที่ต่ำ สูงถึง 250 เมตร จ. สงขลา ยะลา



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินคา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาฤต. ไม้ป่าภาคใต้ – พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า: ภาพประกอบ

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

