

ไม้ต้นเล็ก ขึ้นเป็นพุ่ม ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 17 เมตร ลำต้นอ้วนลำ เรือนยอดแน่น กิ่งล่างๆ มักห้อยลง เปลือก สีเทาถึงดำ บ้าง เรียบหรือแตกเล็กน้อย ไม่มีหนาม เปลือกในสีครีม มียางขาว ใบ กว้าง 1.2 -4 ซม. ยาว 2.5-10 ซม. แผ่นราบเรียบจนถึง รูปรีถึงขอบขนานหรือรูปไข่กลับ ปลายหู่หรือแหลม โคนกึ่งรูปหัวใจ ขอบมักจักฟันหู่ไม่สม่ำเสมอ ไม่มีหนาม ใบแก่เนื้อคล้ายหนังแข็ง สีเขียวเข้มและหยาด้านบน (คล้ายกระ ดาษ ทราย) คนละเอียดด้านล่าง เส้นใบ 4-7 คู่ เป็นวง ก้านใบสั้น ยาวประมาณ 0.5 ซม. ขนละเอียด หูใบยาว 2-5 ซม. ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ต่างช่อบนต้นเดียวกัน ที่ซอกใบหรือกิ่งใต้ตาใบ ดอกตัวผู้เป็นช่อกลม 0.4-1 ซม. ก้านใบยาว 0.2-1.5 ซม. ช่อหนึ่งมี 4-15 ดอก กลีบรวมยาว 1.5-2 มม. เกสรตัวผู้ยาว 2.5 มม. ช่อดอก ตัวเมียออกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ขอ ไม่เป็นช่อกลมหรือหางกระรอก ก้านดอกเรียวยาว 4-15 มม. กลีบรวมยาว 2-4 มม. ยอดเกสรตัวเมียมี 2 อันเรียวยาว 2-5 มม. โคนเชื่อมติดกัน ผล ขนาดประมาณ 0.8 ซม. ก้านผล เรียวยาวได้ถึง 1.8 ซม. ออกเดี่ยวหรือเป็นช่อกลม ยอดเกสรตัวเมียคล้ายเส้นด้าย 2 เส้นที่ปลายโคน มีกลีบรวม ใหญ่ยาว 5-8 มม. สุกสีเหลืองสดหรือส้ม เนื้อฉ่ำน้ำหวาน -พบทั่วไปในที่โล่งต่ำ ปลูกเป็นรั้ว ตัดทำเป็น รูปต่างๆ หรือทำบอนไซ



ข้อมูลอ้างอิง: การ์ดเนอร์, โสมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561 880 หน้า

ภาพประกอบ: ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกทางชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกทางชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

