

Licania splendens (Korth.) Prance & Kosterm.

กระ

วงศ์ CHRYSOBALANACEAE

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้น

ขนาดเล็ก สูงถึง 18 ม. กิ่งก้านเล็กเรียว เปลือก สีน้ำตาลอมเทา แตกตื้นและเป็นแผ่นเล็กๆ เปลือกในสีชมพูถึงสีน้ำตาลแดง แข็งและแห้ง ใบ รูปขอบขนานถึงรูปใบหอกแกมรี กว้าง 2-4 ซม. ยาว 5-11 ซม. เรียวทั้งสองด้าน ด้านอ่อนสีเขียวอ่อน มีเส้นไหมสีเงิน ใบแก่หนาคล้ายหนัง สีเขียวเข้ม เส้นใบสีออกเหลือง ด้านบนเป็นมัน กลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นกลางใบนูนด้านบน เส้นใบ 6-9 คู่ ค่อยๆ จางไปยังขอบใบหรือเชื่อมกันเป็นวงใกล้ขอบใบ ก้านใบยาว 2-5 มม. มีปีกแคบ ด้านบนเป็นร่อง ไม่มีต่อม หูใบรูปใบหอกหรือแคบ ปลายแหลม ยาวถึง 3 มม. ร่วงเร็ว ดอก ขนาดประมาณ 4 ซม. สีขาวอมเขียว ออกเป็นช่อแคบ ยาว 1.5-14 ซม. ที่ง่ามใบหรือปลายกิ่ง มักสั้นกว่าใบ แกนกลางช่อสีเทาจาง ดอกอยู่เป็นกลุ่ม ก้านดอกสั้นมาก (ยาวประมาณ 1 มม.) ฐานดอกยาวประมาณ 2 มม. รูปประฆังเบี้ยว มีขนละเอียดทั้งสองด้าน กลีบดอกเล็ก ขนาดเท่ากับกลีบเลี้ยง สีขาวหรือครีม มีขนด้านนอก เกสรเพศผู้สมบูรณ์ 7-10 อัน ติดอยู่รอบขอบฐานดอก อยู่เป็นกลุ่มด้านหนึ่งตรงข้ามรังไข่ ยาวไม่เท่ากัน ไม่โผล่พ้นกลีบเลี้ยง รังไข่มี 1 ช่องอยู่ใกล้โคนฐานดอกด้านหนึ่ง ไม่มีก้านรังไข่ มีขนชัดเจน ก้านเกสรเพศเมียมี 1 อัน ยอดเกสรเพศเมียมี 3 พู ผล ทรงคล้ายลูกแพร์หรือทรงรี กว้างประมาณ 0.6 มม. ยาวประมาณ 1.2 ซม. โคนสอบแคบและมีกลีบเลี้ยงเล็กๆ มีขนติดอยู่เมื่อสุกสีเหลืองต่อไปสีแดงสด เรียบ เนื้อบาง มีเมล็ดแข็ง 1 เมล็ด ผิวด้านในมีขน พบทั่วไปในป่าดิบที่ถูกรบกวนที่ต่ำ มักขึ้นบนเนินเขาหรือสันเขา พบในป่าพรุน้ำจืดด้วย ตามชายหาด ตามหิน

ข้อมูลอ้างอิง : ไข่มอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาคได้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

