

กระเบาเกล็ด


Hydnocarpus ilicifolia King

วงศ์ ACHARIACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น

ขนาดกลาง สูง 15-20 ม. ลำต้นค่อนข้างเปลา ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ปลายสอบเรียวหรือค่อนข้างเรียวแหลม โคนสอบหรือมน ขอบจักฟันเลื่อยห่างๆ ค่อนข้างปลายใบ ดอกแยกเพศ อยู่ต่างต้น ออกเป็นช่อกระจุกสั้นตามง่ามใบช่อละ 2-10 ดอก กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ค่อนข้างกลม กลีบดอก 4 กลีบ สีขาวหรือเหลืองอมเขียว รูปขอบขนาน ปลายตัด ยาวไล่เลี่ยกับกลีบเลี้ยง มีขนที่ปลายกลีบ ดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้ 14-20 อัน รังไข่รูปไข่ มีขนสีน้ำตาลแดง ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 4 แฉก ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-8 ซม. เปลือกแข็ง ผิวเรียบ มีขนนุ่มเหมือนกำมะหยี่สีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลดำ มี 10-15 เมล็ด เมล็ดอัดกันแน่น รูปไข่ พบกระจายในภูมิภาคอินโดจีน และแหลมมลายู ประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ขึ้นในป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ตามเขาหินปูน และใกล้ชายทะเล บนพื้นที่ตั้งแต่ระดับน้ำทะเลจนถึงสูงประมาณ 800 ม.



ข้อมูลอ้างอิง : http://www.rspg.or.th/plants_data/plantdat/flacourt/hilici_2.htm

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

