


ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น

สูงได้ถึง 25 ม. เรือนยอดแคบ ลำต้นทรงกลม โคนต้นมีพูพอนเล็ก เปลือก สีเทาอมชมพูถึงน้ำตาล รมเทา หยาบ ลอกออกเป็นแถบเล็ก เปลือกในสีเหลืองถึงน้ำตาลอมส้ม มีเส้นใย ใบ ออกเวียนสลับ รูปรีแคบ ถึงรูปขอบขนาน กว้าง 2.8-8 ซม. ยาว 6-16 ซม. ปลายทู่หรือค่อนข้างแหลม โคนทู่ถึงสอบ ขอบเรียบ เนื้อ คล้ายหนังบาง เกลี้ยง เส้นกลางใบนูนด้านบน เส้นใบ 11-15 คู่ เล็กเรียว ค่อนข้างตรงแบนและนูนเล็กน้อย ด้านบน นูนชัดด้านล่าง เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันไดชิดกันมากและขนานกัน จางทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 1-4 ซม. เล็กเรียว บวมด้านเดียวที่ปลายบน ตาใบรูปโคนแคบ หุ้มด้วยหุ้มใบแหลม ยาว 0.5-1 ซม. กิ่งสีน้ำตาล รมเทา ค่อนข้างแบนมีรอยแผลเป็นของหุ้มใบเปื่อยๆ ดอก สีครีมถึงเหลือง สมบูรณ์เพศ สมมาตร เป็นช่อแคบ ไม่แตกแขนง ยาวถึง 15 ซม. ตามซอกใบ ก้านดอกสั้นมาก (ยาวน้อยกว่า 2 มม.) กลีบเลี้ยงจักพู่ลึก 5 พู่ ยาวน้อยกว่า 2 มม. กลีบดอก 5 กลีบแยกกัน รูปรีหรือขอบขนาน ยาวประมาณ 3 มม. ปลายทู่ บิดในตาดอก จานฐานดอกรูปถ้วย ไม่จักเป็นพูชัด มีเกสรเพศผู้ 5 อัน ติดใต้ขอบด้านนอก อับเรณูแตกด้านข้าง รังไข่ 2 ช่อง แยกจากจานฐานดอก รูปกลมมีกระจุกขนคล้ายไหมที่ปลาย ก้านเกสรเพศเมีย 2 อัน ยาวกว่ารังไข่ ผล รูปไข่แคบหรือรูปลูกกระสุน กว้าง 1 ซม. ยาว 3 ซม. ปลายแหลมโค้ง มีร่องตามยาว 2 ร่อง ไม่แยกเป็นพู แก่แตกข้างเดียว สีเขียว เมื่อสุกสีเหลืองหรือส้มอ่อน มี 1(2) เมล็ด รูปขอบขนาน มีเนื้อสีส้มอมเหลือง หุ้มที่โคนขึ้นมาไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผล พบทั่วไปในภาคใต้ ในป่าดิบที่ต่ำและป่ารุ่น



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน พินดา สิทธิสุนทร ก่องกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปท. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี