


ชื่ออื่น คำสามซีก แควหาง จันทน์ดง ทวายเด่น พญารากดำ, กระเจียน โมดตง สะบันงาป่า เหลือง

ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. กิ่งแก่มีช่องอากาศ มีขนสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อนและแผ่นใบด้านล่าง ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 6-19 ซม. ก้านใบสั้น ช่อดอกออกตามซอกใบส่วนมากมีดอกเดี่ยว ก้านดอกยาว 1-2 ซม. ใบประดับคล้ายใบ 1-2 อัน ติดได้กึ่งกลางก้านดอก ติดทน กลีบเลี้ยงรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 8-9 มม. ด้านนอกมีขนยาว ดอกสีเขียว กลีบยาวเท่า ๆ กลีบเลี้ยง แผ่นกลีบหนา มีขนประปราย คาร์เพลมีขนสั้นนุ่ม ก้านช่อผลยาว 1.5-2 ซม. ผลย่อยรูปรีกว้าง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 มม. สุกสีแดงและดำ ก้านผลย่อยยาวเท่า ๆ ก้านช่อ ส่วนมากมีเมล็ดเดียว

พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบทุกภาค ภาคใต้ถึงชุมพร ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ หรือบนเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 1200 เมตร เปลือกเหนียวใช้ทำเชือกหรือกระสอบ ดอกใช้ทำน้ำหอม



ข้อมูลอ้างอิง : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Polyalthia0cerasoides0\(Roxb.\)0Benth.010Hook.0f.0ex0Bedd.](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Polyalthia0cerasoides0(Roxb.)0Benth.010Hook.0f.0ex0Bedd.)

ภาพประกอบ : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Polyalthia0cerasoides0\(Roxb.\)0Benth.010Hook.0f.0ex0Bedd.](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Polyalthia0cerasoides0(Roxb.)0Benth.010Hook.0f.0ex0Bedd.)