

กระบากดำ


Shorea farinosa C.E.C.Fisch.

วงศ์ DIPTEROCARPACEAE

ชื่อพื้นเมือง : กระบากดำ,เคียนทราย,ตะบากดำ,มะรันตีสะตา,ยอวกำ,เหล็กปัก,स्या,เหี้ยตงะบ๊ะ

ไม้ต้น

กิ่งผลัดใบ สูงถึง 30 เมตร เปลือก สีน้ำตาลอมเทา หนา แตกเป็นร่องลึก เปลือกในสีเหลืองอ่อน ถึงเหลืองแก่ มีเส้นใย ใบ รูปรีกว้างถึงรูปขอบขนาน กว้าง 2.5-6 ซม. ยาว 8-15 ซม. ค่อยเรียวแหลมไปยังปลาย ปลายใบยอดบาก โคนทู่หรือกลม เนื้อคล้ายหนังบาง เกือบทั้งสองด้าน มีตุ่มใบขนเส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน ฐานด้านล่าง เส้นใบ 12-18 คู่ เล็กเรียวโค้ง มีขนสั้นแซมระหว่างเส้นใบไม่มากนัก ฐาน เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันไดเห็นได้ชัด ก้านใบเรียว ยาวประมาณ 1.8 ซม. ดอก สีขาวถึงเหลืองอ่อน ช่อใหญ่ยาวถึง 18 ซม. ที่ปลายยอดและง่ามใบบน เมื่ออ่อนมีขนละเอียด ดาดอกรี กว้าง 4 มม. ยาวถึง 6 มม. กลีบเลี้ยงมีพู่รูปรีแกมรูปไข่ ไม่ค่อยเท่ากัน กลีบดอกรูปขอบขนานแกมรูปไข่ มีขนส่วนบนที่ยื่นออกมาจากตา เกสรเพศผู้ 25 อัน อับเรณูรูปขอบขนานแคบ ปลายมีรยางค์คล้ายเส้นด้าน ยาว 1.5-3 เท่าของอับเรณู มีขนที่ครึ่งบน รังไข่รูปไข่แคบ มีขนละเอียดถึงค่อนข้างเกลี้ยง ปลายเรียวไปยังแท่งก้านเกสรเพศเมียก้านเกสรเพศเมีย ยาวกว่ารังไข่ ปลายแยกเป็น 3 ง่าม ผล ปีกยาว 3 ปีก กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 6-9 ซม. รูปคล้ายซ้อนปลายทู่ มีขนหรือเกลี้ยงอีก 2 ปีกสั้นเล็กกว่า 0.5-1 ซม. ยาว 2-5 ซม. ตัวผลรูปไข่ กว้าง 1.5 ซม. ยาว 3 ซม. ปลายเรียวแหลม เกือบโคนปีก หุ้มผลมิด พบในป่าดิบที่ต่ำ ใกล้น้ำ



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ฟินดา สัทิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาสได้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

