

## ไม้ต้น

ขนาดกลาง สูงถึง 20 ม. เรือนยอดแฉะ ลำต้นใหญ่สั้น แตกกิ่งต่ำทำให้มีกิ่งในแนวนอนจำนวนมาก ไม่มีพุ่มพอง เปลือกสีเทาอมเหลืองถึงสีน้ำตาลเข้ม แตกเล็ก เปลือกในสีชมพู มีน้ำเลี้ยงใสสีคล้ายน้ำผึ้ง



**ใบ :** ใบรูปไข่ถึงขอบขนานแกมรีกว้าง หรือค่อนข้างรูปไข่กลับ กว้าง 4.5-8 ซม. ยาว 8-18 ซม. (ประมาณ 2 เท่าของความกว้าง) ปลายกลมหรือเป็นแฉ่ง โคนสอบแคบ ขอบมันเข้าเล็กน้อย เนื้อใบคล้ายหนัง เกือบเส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน เส้นใบด้านล่างชัด เมื่อแห้งบนทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 1-2 ซม. ค่อนข้างใหญ่ หนาปลายยอดยาว 0.5-1 ซม. มีขนสีน้ำตาล

**ดอก :** ขนาด 2-2.5 ซม. ออกเป็นช่อหลวมแบบช่อกระจุก ยาว 5-8 ซม. ที่ซอกใบบนๆ เกือบหรือมีขนสีน้ำตาลอ่อนประปราย ช่อดอกหนึ่งมี 9-13 ดอก ก้านดอกยาวถึง 3 ซม. (ก้านบนๆสั้นกว่า) กลีบเลี้ยง 4 กลีบ เกือบหรือมีขนประปรายเฉพาะที่ขอบ กลีบคู่ในรูปรีหรือรูปไข่หรือกลม ยาว 6-7 มม. เนื้อหนาค่อนข้าง กีบคู่ในรูปรีหรือไข่กลับเนื้อบางคล้ายกลีบดอก 4 กลีบ คล้ายกลีบเลี้ยงคู่ในเกสรและค่อยๆโค้งกลับ เกสรเพศผู้ 100-250 อัน ยาว 5-7 มม. รั้งไข่สีชมพู ก้านเกสรเพศเมีย ยาวกว่าเกสรเพศผู้



**ผล :** ผลกลมหรือรูปไข่ ขนาด 3 ซม. ปลายกลมหรือรูปคล้ายห้วนม เกือบ เปลือกหนาสีเขียวขุ่นถึงสีออกน้ำตาลเมื่อสุก

พบมากตามชายหาด และชายฝั่งที่เป็นต้น

อ้างอิงข้อมูล : ไซมอน การ์ดเนอร์ ฟินดา สิทธิสุนทร และก้องกานดา ชยามฤต. ไม้ป่าภาคใต้เล่ม 1. ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ ; 2559 (หน้า 293)

ภาพประกอบ : Flickr by ( Ahmad Fuad Morad, Forest and Kim Starr, Lauren Gutierrez , Oriolus84)

