

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-25 ม. บางทีมีพูพอน เปลือก น้ำตาลแดง ผิวขรุขระ เปลือกในสีครีม ใบ กว้าง 3.5-7 ซม. ยาว 10-18(28) ซม. รูปขอบขนานแคบถึงใบหอกกลับ ปลายเรียวแหลม โคนแคบ เนื้อคล้ายหนัง บางเกลี้ยงด้านบน มีนวลและเกลี้ยง หรือมีขนละเอียดกระจายด้านล่าง เส้นกลางใบแบนด้านบน เส้นใบ 7-11 คู่ แบนหรือเป็นร่องเล็กน้อยด้านบน เส้นใบย่อยคล้ายเส้นบันได หรือบางส่วนคล้ายร่างแห จางทั้งสองด้าน ดอก ออกเป็นช่อคล้ายช่อกระจุก หรือคล้ายช่อกระจุกสั้น ยาว 0.8-1.2(2.5) ซม. ตามซอกใบหรือตามกิ่ง เกลี้ยง แต่ละช่อซี่ร่มยาว 0.8-1.3 ซม. มี 5-6 ดอกต่อ 1 ช่อซี่ร่ม แต่ละดอกมีก้านดอกยาว 2-4 มม. มีขนแน่น กลีบ รวมและก้านอับเรณูมีขน ผล ยาว 0.9-1.2 ซม. ก้านผลใหญ่ล่ำ ยาว 4-7 ซม. กลมแบน หุ้มด้วยถ้วยกลีบรวม หนา และมีตุ่ม 1/2 ของผล ขอบเป็นคลื่น เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 1-1.2 มม. พบน้อยในป่าดิบ สูง 50-700 ม. จ.ระนอง นราธิวาส



อ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร ก่องกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้เล่ม2 – พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

