

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 30 ม. พบน้อยเป็นไม้ต้นเล็ก สูงได้ถึง 7 ม. กิ่งเล็กเรียว แตกยอดอ่อนสะพรั่ง เปลือกสีเทาอ่อน เรียบและบาง ใบ กว้าง 2-8 ซม. ยาว 8-20 ซม. พบน้อยกว้างได้ถึง 12 ซม. ยาวได้ถึง 30 ซม. ออกเวียนสลับ หรือแบนระนาบเดียวกัน รูปรีแกมขอบขนานหรือไข่กลับ ปลายเรียวแหลม โคนรูปกลม ขอบจักซี่ฟันละเอียด ถึงเกือบเรียบ ใบแก่สีเขียวแกมเหลืองถึงเขียวแกมน้ำเงิน กลี้ยงหรือมีขนออกน้ำตาลเฉพาะบนเส้นใบ ไม่มีตุ่ม ใบ เส้นใบ 7-20 คู่ ระยะห่างค่อนข้างเท่ากัน เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันได ค่อนข้างจางทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 0.3-1.2 ซม. หูใบยาว 4-11 มม. ปลายแหลม ดอก สีขาวถึงครีมออกเหลือง เป็นช่อแตกเป็นง่าม มี 3-8 ดอก ก้านช่อดอก ยาว 0.5-3 ซม. ที่ง่ามใบหรือเหนือง่ามใบบนๆ ก้านดอกยาว 3-8 มม. ใบประดับรูปใบหอก ยาวประมาณ 2 มม. กลีบเลี้ยงยาว 3-5 มม. สีเขียวอ่อน ไม่เท่ากัน ซ้อนชุด กลีบดอกยาว 4-8 มม. ปลายกาง มีขนด้านนอก อับเรณูมีรยางค์ใหญ่ 1 อัน เล็ก 1 อัน รังไข่และก้านเกสรเพศเมีย มีขน ผล ยาว 0.8-1.5 ซม. สีเขียวสด ทรงกลมถึงรูปไข่ ปลายมีก้านเกสรเพศเมีย ติดทน มีขน มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกที่โคน มีขนนุ่ม เมล็ด (2)3 เมล็ด สีน้ำตาล ยาว 3-6 มม. พบในที่ร่มในป่าที่ต่ำที่ยังไม่ถูกทำลาย ใกล้น้ำ



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกทางชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี