

Casearia pseudoglomerata Sleumer

กรวยใบมัน

SALICACEAE (Flacourtiaceae)

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็ก สูงได้ถึง 10 ม. กิ่งเล็กเรียว เปลือก สีน้ำตาลสด เรียบ บาง ใน กว้าง 3-5 ซม. ยาว 10-13 ซม. รูปขอบขนานแגםรีส์ในหอกแגםขอบขนาน ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนรูปลิ่ม เปี้ยวเล็กน้อย ขอบเรียบ ใบแก่เนื้อคล้ายกระดาษหนัง เป็นมันด้านบน เกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบ 6-7 คู่ โคงชัน นูนเล็กน้อย ด้านล่าง เส้นใบย่อยคล้ายขั้นบันได เส้นใบเล็กๆ เป็นร่องแท้แน่น ค่อนข้างจะ ก้านใบยาว 0.6-1 ซม. หูใบยาว 3-6 มม. รูปสามเหลี่ยมแคบ โคนคล้ายติ่งหูใบกิ่ง เกลี้ยง ร่วงเร็ว ดอก ออกเดี่ยวหรือ 2-3 ดอก ที่ก้าน ดอกยาวประมาณ 1 มม. เกลี้ยง ใบประดับเล็ก มีขันที่โคน กลีบเลี้ยง ยาว 1.5-2 มม. รูปไข่ เนื้อคล้ายกระดาษ เกลี้ยงทั้งสองด้าน เกสรเพศผู้ สมบูรณ์ 8 อัน ก้านชูอับเรณูเล็กเรียว ยาว 1.5 มม. เกสรเพศผู้เป็นหมัน มีขัน โดยเฉพาะใกล้ปลาย รังไข่รูปไข่แคบ เกลี้ยง ผล กว้าง 1-1.5 ซม. ทรงกลมถึงค่อนข้างกลม สีเหลืองสด เรียบ หรือมีตุ่ม แก่แตกเป็น 3(2) ส่วน เมล็ดกลม 1-3 เมล็ด กว้างประมาณ 2.5 มม. มีเยื่อหุ้มบางสีแดงสด พบร้า ไป ในเรือนยอดขั้นรองในป่าดิบที่ต่ำ จังหวัด พังงา ภูเก็ต พีชประจำถิ่นของภาคใต้



ข้อมูลอ้างอิง : ก้าวเดอร์, ไอมอน ไม่ปักใจ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อุตสาหกรรมพอกพูนกัพนอลลิชั่น จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

